


René de Saint-Périer: La grotte des Harpons (Haute-Garonne)

L'Anthropol. XXX, 1920, str. 209-234

1

Premnopus magdaleinicus
i mójsciuzy do arylotkięgo.



Hartwa A grub. 60-josek.-ognisko archiologiczne b. czasu. Znaleziono w nim wiele kości obozowych koniecznych celu po przygotowaniu koni do bitwy. Portale prezentują poziomu jest magdaleński poziom aż do poziomu arabskiego. Wczesny kultura poziomu reprezentuje most do wody z kościami ptaków; poziom opadającym reprezentuje radionowy; a części dolnej kościami o jednym reprezentuje radionowy.

Portale le prezentują nie były oddzielone od siebie i znajdują się w skarbie jaskini patowemu.

Autor organi sporządzające graha te były zainteresowane położeniem archeologicznego w skarbie jaskini patowemu.

Preliminiarne schematyki des Hartwass

ad magdaleński o jednym poziomie radionowym aż do arabskiego.

Fauna:

Equus caballus - b. officie.

Tarandus rangifer - officie (nieco offity mii w Langere i Reithac. Przygadzona typ Woodlands, offity w Grimaldi, nadalina Francji).

Bos sp. reby i kości tufowe - sciegle nie określony

Rupicapra europea

Capra sp. molerions reby, nie sciegle określony.

Vulpes vulgari - rebyki dolne nichotyplebne i kości - officie. Kościki tego typu lisa są oryginalne mii w południowej, zbiórka w jas do Giza i Grimaldi.

Lynx scrofa -

Arctos marmotta

Ptaki - wiele drapieżne.

Nyctea nivea b. officie.

Pyrrhocorax alpinus - deviny mroźne

Gallus sp.

Lagopus (szafi del. mutus)

Grus priusigenaria - kość kości błyż uszczornione i skrócone po stronie.

Cygnus olor?

Anas boschas?

Ryby *Squalius cephalus*, *Elox lucius*

Migrali *Pecten maximus* - Atlantyk (unter mediterranei)
Nassa reticulata - " (driemaisonie)
Turritella communis , i m. Y. d. dr. (drierau.
Dentalium sp. wykorzystanie rośnicy ilandy
 malow. aliny)

Narzecchia kremowa

Występuje w naturalnych kremach i leps porów nieniż organicznych
 b. maty. charakteryzuje retronormalne. Izotypie odstępów b. jest przedłużona
 cane na narzecchia(!!).

Włosy (Lamec) - 22 włosy markie nadretronormalne, najdłuższy 96 mm.

Ostatnieli - (Lamec à encaché) jedne z nich z drobnymi włosami,
 regularnie rozrzuconymi na jednym kraju, innych na drugim z
 jednym wyciągiem brzegu. time przedostatnia i fragmenty
 potupanego zdrowia, drapieżny i gospodarczy, oddzielają się regularnymi
 mozaikowymi charakterem retronormalnym. Włosy z części mają
 wykroj archaicznego i pomyślnego postrzelenia formy i organizacji.

Lamec à 10% kilka sekcji maty z drobnymi markich, jedne z nich
 z głowami ranerelionym, inne z ber rekumu grzbietowego, przedostatnia
 brzeg (coś), które mało styczne do osadzania w sprawie. Jedne
 z nich pochodzić od niosących ryb (a więc z drogą additivę
 rybów!) inne, leps samego pochodzenia b. retronormalne porów
 z ewicą dalej. drapieżny charakter wydaje (brzeg), prawie
 cylindryczne i poroada niekiedy encache "retronormalne". Kilka dalej
 z nich wrenie b. retronormalne z ewicą jawną z celu utworzenia przed-
 waria (perforata).

Lamec de cauf' niewła ilość b. maty zdrobow. o głowach retronormalnych
 adponista tenek typu. lamina u goliwic nie wykazująca w restry.

3.

Lame denticulées - 15 wtórków (lamelles) o błękitu retunowanych lub nie przedtorzających się wyciągów (encahés) symetryczne na brzegach. Typy te są t. obok na permy Shouris i Małych Magdal.

Scies - Kilia widały retunowane charakterystyczne na brzegach, ale bez wyciągów (encahés), - stądż, jako podobni, z uderzeniami myktykami przedtorzającymi (denticulées) a prawdziwymi (denticulées) (encahés), które natomiast tworzą dość dużej głębokości narożeń koscianych i nosorygów.

Pointes - 5 długie adiupcioi trojkątne i wydłużone o kierunku retunowanego, z jednej strony, o wąskich ostrzach miękkich, ale z uniejszą grubością charakterystyczną narożaną w tamte. Wcześniej podobne do analogicznych rechromistów Sardze (Abri Buxare?)¹⁾

Zyngbia (racloirs) - 6 okrągów z adiupcioi grubymi, rektangelowymi, potkrawikowymi, na jednej z których brzegach, przedtorzających, z uniejszą grubością charakterystyczną retunowaną w tamte. Ta forma, "Rhyptique dans le Magdalénien" ma już wtedy wąskie i głębokie narożeń i uniejszą głębokość.

Znajdują się również w Grand-Presigny i Siroles (Loiret).

Ryby - 294 rebrano na tym pionie. Ryby o ostrym połysku myktykach adnięciach skumis 98% + skorupki do rybów i rybów poligonalnych. Paryż z rybami o ostrym połysku klinowatym (bez de flûte) przedtorzających 57% rybioru. Z uderzeniami 3 rybki biegaczy, skorupki brzegowe nadające w Magdaleńskim. 9 rybów na drapacze, 11 padacze, 10 ryb. Ryba leżała na drapaczu i padaczu w charakterze kalku i sucha z przedtorzającimi mikro-wielkimi, o głębokości uniejszej niż 1 cm. (mniej 2 cm dla padacza rybiego?) i skorupki 1 cm głębokości.

Skrabacie (gratotres) - 165 okrągów. Wcześniej wanych charakterystycznie, obok harpunów płaskich i rogi jelenia z uderzeniami 9 rybów skrabaczy brzegowych. Jesteś (117 ok.) są na koralach i skorupach skorupach i głębokościach 3 cm, co na skorupach grubości i nie regularnych. 2 skrabacze T. olbrzymie i 1 drewniowy przypominający formy charne, które powstawały z padaczu magaleńskiego. Wcześniej 2 skrabacze padacze i których jeden ma zanierwioną charakterystyczną głębokość 3 miliometrów.

1) Breuil et Dubatet, Rev. Anthr. 1901, t. 262 fig. 82.

Rzepie - 4% ob. skorupy i b. matył.

Turki - Jeden skor. z rzepiem. Jest to jedyna masechka muleriana w całości warstwa z akcesoriami kwaszącymi, które były wyizolowane bieżącą na dnie kamieni.

Hymby i kości i nogi

Harpuny - Na poniżej poziomu A muleriana 4 harpuny płaskie z nogami jelenia, o podstawie nieokrągowej. Jeden z nich jest z zadniem po jednej stronie (fig. 2 ryc. 3) i ma w jego osi i dnie otwór. Ostatni, z którym jeden jest muleriany w nacie, który w środku skrzynkowe matyły skrobacze skorupy koralowej.

One poziomy z kramem koncentrycznym maledesmeus lub porphyria cingulata. Pierwszy w leżaniu, warstwa pod cekalem brązowy; koncentryczny, muleriana harpuny o podstawie niesymetrycznej (fig. 2 ryc. 8) i dwie dolne warstwy muleriana harpuny o jednym nacie osi b. pochyłej. Matyły skrobacze podskarpe gniazdowe. Jeden z tych harpunów kramem delikatnym mały tyłek z radiem.

Ten poziom przedstawia wiele unikalnych typów charakterystycznych harpunów od pierwszych potowym maledal. aż do tykliowych. Przed tym mulerianie składa się skorup baquettes demi-rondes (2 radijone ornat. grom.) ryc. 2/6. war baquette z nagi reuf. ryc. 7. Stadikli - (lisostri) obręcze brązowe. trydki (pains d'ours), istoty kościane i unkustki.

Ordyki (objets de parure) liczące skorupy morskie drzewiastone, z relikwii i t. kielich jeleniów refleksja pierwotnego mulerianu w leżanie. Kielich jest potowym obiektem harpunów płaskich z osią górną warstwy. Należą m. in. rury przedniowe żelazne frak. Kości ptasie, żółwiańskie i czerwów gąsienicowych i skorupy brązowe frak. Kościowe, w kontakcie z tą warstwą pierwotną (ryc. 3 fig. 2).

Porion B.

Ja wantka podobnie jak poprzednia, była ramienista, na czele niej wprostna! Walerj nawiązi do maydalenów, ale ramiona były jedynie karpami.

Fauna: Istnieje takie same jak w wantce A poza Capra, sus, Arctomys, ovis nove: Canis, lupus - b. duis, egzemplarz podobny do innych z Gargas.

Mustela putorius, trivola terrestris, Bufo sp.

Ptaki: Artur palumbarius, Pyrrhocorax alpinus, Perdix sp. (petrosa?), Lagopus albus, Totanus sp. lub Machaerops pugnax, Merops serrator.

Międzalne: Natica josephinae - m. Trödr.
 Purpura lapillus - o. Atlant.
 Natica catenata - " (drin.)
 Natica litorea - " "
 Cypraea lurida - m. M. Adriennus
 Ostrea sp.
 Ostrea ostrolata (fossil)
 Pecten jacobaeus — m. Adrienn.
 Pecten maximus — o. Atlant.
 Pectunculus glycimeris " "

Gryby kremińskie - Nendiarstro kremińskie porionu B jest b. podobne do nendiarstro porionu górnego, owo rosnące skora iż z nimiż nendii, skaramidek tenowanych i drobnych szwianów. Inakim jest pranie wszystkie typy jui ramionowe z poprzednią wantką: istotny "encoches" tworząc drapacze uszkie (seduo z ramionami jest utworzone przez uszki i podstawę drapacza typu boga), lamia soie, lamia de caud i dos rabatte, lames denticulées, z których jeden ma 5 uszki (encoches) i na jednej stronie i 3 na drugiej skaramidek uszkiem

psłki, pucharszare (perçoirs), 100 drapaczy z brązowym,⁶
3 drapacze na grubym ^{gron} d'uphead, 5 drapaczy - rylecę,
1 drapacz padnięty, 2 skrobane - strągi (rabots);
150 rylecę przerę umięśnione z obrzeżami prostymi, 2 rylecę pad-
nione; 12 rokieni. Należą tu również brązowe ostrygi i rynoplasty
typu archaicznego, które są mojdrozaty w warstwie
żółtej (A) i obecnie są duchem w dawnych kryptbach żółtej;
które były tufany, ale teraz retenują brązowią barwę;
jeden duży kryształ żółty, który „pan” był od kiedy
i który ma głęboki żółty kolor rylecę; najgłębszy żółty żółty żółty
tak intensywny jest stopiony w rukach wytwarzających
dzieła (zwykle jest to Tanczka). Należą tu typy
z kryształami.

Wyroby z kosti i rogu

Saqaires - 2 porownane B. z miedzianymi fragmentami zegarowymi

Kissoirs - kilka dużych głazów kostnych z rogiem jelenim
i renif.

Jągły - „duże” kostki i różnego rodzaju naciągi

Różne przedmioty - autor malarz „une lampe incomplète” (?), fragm. kostek antropologicznych na środku cewnej trzustki przypominające „les cuillers ou marou-spoons”, mające
zamek do różnych stanowisk (Rettig. aquitan. B. Pl. XVII, 144).

Ordoby - skorupy dierowatone, siekanie renif. dierowane
i dwa niewielkie róznice dierowane matago pierwoszare
(Chamot) - wielkość? Kalka zainenka (pseudoleoque)
z fragm. rogu renif. Tufany stołkowane, ogłoszone; pne-
moniczne dierowatone.

Dzielanki B. ciekawe - nacyły z lebką i rybami;

Warka C

7.

prędkość równej mocy dnia i nocy warka górnego jest mała rano wieczorem i punktu w dniu nadrianie krem. i przedniokostkowa, nie jest tak samo mocy typu dnia a warka C. która należałaby do magdaleńskiego, ale wydaje się od dawna zawsze gorszych i grubych kremówian i kremów sagi. jak to często notowano, ten magdalenny jest charakterystyczny pierwotnie i nie Tepanica kremowa. i daje się, iż będzie typu wczesnego nie dawnych i do konkretnego przedstawiających rauszardów i wiele innych.

Tauna ^{roku} tyle w warkach a poza Capra i sus

Cervus lupus, istnieje w warkach B, najdalej w tukaj róznici. Pojawiają się dwa nowe gatunki:

Hyena crocata, Felis, sp. - ornamentals. pseudo-

Ptaki ^{al fab. znakami.}

Aquila chrysætus.

Nyctea nivea

Lagopus albus

Mergus serrator.

Micratis Arca Pelii - m. Tyndrum (diuraw.)

Naredriastro kremowe Wyskości typów jasnych w warkach t. B. Wydaje się Tepanica mniej do konkretnego; grubym prawie wszystkich naredriastów rdąże się być ile wybrane: on musi być ile są nadawać do Tepanica, gdyż malowniczo dwoje fragmentów naredriastów nie regularnych. Jeszcze naredriastów do blasków magdaleńskich: drapacze, i wyskości na astrophach neregularnych (drapacze H. bore laetitia);

skrobane - zynekta, w idz. rylec, drapacze ugiestwili
 (concavus), it. d. Mata idz. tykowce zy marmie nadne
 uzi w warstwach gloszyl. W idz. zebatyk (denticalis)
 brak reprezentacji. Nie moleriono nardii mikrokratyczny
 i struktura rebanowana jest i delikatniejsza jaka w warstwach
 gloszyl.

Wyroby i hosc i rogu

Saqies, Patutes de lance ou poignards, poinçons,
 spatules, pendeloques?, objets de parure, gravure,

Warstwa Etatut. glosz

Przykłady:

Doskonale - piękne przedmioty neolityczne i spiralcy
 z warstwy i w dolnej szkaruzie w opactwie bramie i gospodarcze
 Prencall. Przedmioty z gipsu, masek jedynie i kowadla i
 Arudy, ktora odnajdywala sie terenem do lotu. Zbadanie
 fauny porolito strukturalna i istnienia gloszka t.
 nadkierowana i dyskusja. Grys prymigenius, dolny i nizszy
 nego.