

Pugillus plantarum novarum Americae centralis
et meridionalis

auctore

Dr. Ign. Szyszylowicz.

Rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydz. matem.-przyr. dnia 2. stycznia 1894 r.
ref. czł. Rostański:

— — — — —
Doliocarpus oaxacanus Szysz. nov. spec.

Frutex, foliis coriaceis elliptico-lanceolatis utrinque glaberrimis ante remote acute serratis postice integris 13—22 cm. longis 5—7 cm. latis, basi in petiolum 8—20 mm. longum attenuato decurrentibus. Flores umbelloideo fasciculati 8—10 axillares, pedicellis 5—12 mm. longis pubescentibus, bracteolis ovatis extus puberulis, calyce 4—5 phyllo puberulo, sepalis subaequalibus ovatis acutiusculis 2—8 mm. longis, corolla ?, staminibus sepalis duplo longioribus, connectivo haud producto antheris ovatis basi divergentibus, ovario globoso glaberrimo, stylo brevi tereti flexuoso glaberrimo, stigmate magno peltato emarginato. Bacca ?

Species Doliocarpo Eichleriano Gilk. (*D. castaneaefolius* Mart. non Schott!) affinis sed foliis longius petiolatis, pedicellis et calyce pubescentibus bene distinguenda.

Oaxaca 1842 legit Franco (Spec. in herb. Musei palatini Vindobonensis).

Rollinia cordifolia Szysz. nov. sp.

Frutex 15 met. altus (teste Poeppig), ramulis novellis petiolis foliis subtus inflorescentiaque fulvo pubescentibus, foliis 10—12 mm longe petiolatis ovatis vel oblongis breviter cuspidatis basi subcordatis, integrimis coriaceis, supra nervo primario secundariisque exceptis pilosis, subtus pilis simplicibus fulvo tomentosis, nervo primario secundariisque valde prominentibus, venis parallibus, 15—22 cm. longis, 10—12 cm. latis. Flores solitarii, pendunculibus 3·5—4 cm. longis, bracteati bracteolatique, sepalis late ovatis, longe cuspidatis dense fulvo tementosis, petalis? staminibus?, pistilliis densissime compactis, fulvo tomentosis. Fructus ovoides, 4—5 cm. longus, 2 cm. latus, subcoalitus.

Maynas in fruticetis ad Yurimaguas Decembr. 1830 legit Poeppig (*Annona cordifolia* Poepp. in sched. D. 2090, Spec. in herb. Musei palatini Vindobonensis).

Gatunek ten z powodu braku płatków nie dozwala na dokładne oznaczenie rodzaju. Jakkolwiek Poeppig w notatkach swych załącza go do rodzaju Anona, to sądę jednak, iż gatunek ten dla innych swych cech morfologicznych powinien być raczej zaliczony do rodzaju Rollinia, gdzie go też umieszczam.

Apeiba Tibourbon Aubl. var. **rugosa** Szysz. nov. var.

Ramulis griseo-flavis, dense tomentosis; foliis oblongis acuminatis basi subcordatis, margine leviter inaequaliter dentatis, membranaceis, supra rugosissimis glabris solum nervibus leviter puberulis brunneo-flavis, subtus dense tomentosis, flavis, 14—19 cm. longis, 5—7 cm. latis. Stipulis caducissimis, inflorescentia terminali, bracteis bracteolisque magnis, sepalis crassis petala superantibus, antheris longe pilosis.

Guyana gallica. Karouany 1859 (herb. Sagot 59 in Museo palatino Vindobonensi).

Apeiba Schomburgkii Szysz. nov. spec.

Arbor ramulis petiolisque chryseo-tomentosis, foliis membranaceis simplicibus, alternis pedatinervis, 10—15 mm. longe petiolatis, basi bispurculatis ellipticis, plerumque longe acuminatis, basi angustatis, margine inaequaliter acute serratis, utrinque iuventute puberulis, supra mox

glabratiss 12—20 cm. longis, 6—10 cm. latis; stipulis caducis, lanceo-latis tomentosis 7—15 mm. longis 2—3 mm. latis. Inflorescentia cymosa lateralis, pedicellis bracteatis bibracteolatisque, floribus medioeris, colore? sepalis 5 liberis, valvatis elliptico lanceolatis acuminatis, extus chryseotomentosis intus glabris 18 mm. longis, 3 mm. latis; petalis 10 mm. longis, 6 mm. latis, obovatis basi angustatis. Stamina ∞ indefinita, pluriseriata, aequalia, omnia fertilia, filamentis curvatis glabris, interioribus liberis, exterioribus in tubam campanulatam connatis, antheris oblongis, areuatis, pilosis, rima longitudinati dehiscentibus, connectivo ultra loculos in apiculum membranaceum producto. Discus nullus. Ovarium sessile suborbicularare dense flavo-pubescentis, 3 mm. longum, 20 loculare, loculis multi ovulatis, ovulis anatropis; stylo simplici terminali apice stigmatoso-multi denticulato, 12 mm. longo. Fructus?

Guyana anglica leg. Schomburgk n. 734, 400 (in herb. Musei palatini Vindobonensis).

Caracas, Capaya sub *Apeiba Tibourbon* Aubl. leg. Dr. H. Karsten (in herb. Musei palat. Vindobonensis).

Brunellia integrifolia Szysz. nov. spec.

Arbor ramulis iunioribus sulcato angulosis, crasse medulatis, brevissime ferrugineo tomentosis. Folia opposita, stipulis binis minutis dentiformibus, caducissimis instructa, imparipinnatifida, 5—7 iuga, 35—45 cm. longa. Foliola opposita, sessilia, oblonga, apice rotundata, brevissime attenuata vel acuta, basi valde inaequilatera, rotundata, integerima, apice undulata subcrenulata, coriacea, supra pulverulenta demum pulla nitida nervo primario secundariisque dilutioribus pilosiusculis, glabrescentibus impressis, infra brevissime ochroleuco-tomentosa nervis prominentibus pilosiusculis luteo-fuscis, 12—16 cm. longa, 4·5—5 cm. lata. Inflorescentia axillaris, paniculata, fulvo-tomentosa, 7—10 cm. longa, 4—6 cm. lata. Flores dioici, brevissime pedicellati, congesti, bracteis anguste lanceolatis, caducissimis, aequilongis suffulti, 2—3 mm. longi; calyce persistenti, petalis quinque, valvatis, extus fulvo tomentosis, 2—3 mm. longis; petalis nullis. Stamina 10, aequalia, disco vix distincto floris receptaculum vestienti circum circa inserta, glaberrima, sepalis paulo breviora, filamentis teretibus, antheris ovatis apice brevissime apiculatis filamentis paulo longioribus, medio dorso introrse affixis. Carpella (in flore ♀) quinque, dense hispido tomentosa, unilocularia, biovulata, stylo uncinate extrorsum recurvo, glabro, longisculo termi-

nata. Capsulae quinque, secedentes, 2 valves, mono(bi?) spermae, dense ferrugineo-hispidae, 6—7 mm. longae, endocarpio cartilagineo soluto.

Species Brunelliae inermi et Brunelliae aculeatae Ruiz. et Pav. Flor. per. syst. pag. 127 proxima, foliolis integerrimis carpelis hispidisque bene distinguenda.

Caracas Colonia Tovar leg. Moritz no. 1739 (♂); leg. Dr. H. Karsten (♀) (in herb. Musei palatini Vindobonensis).

Dublany w grudniu 1893.

