

CATALOGUE DES CLÉRIDES

De la collection de M. A. CHEVROLAT.

A l'exemple de M. Adam White, qui en 1849¹ a publié un Catalogue des Clérides faisant partie des espèces de la collection du British Museum, a décrit celles qui étaient nouvelles et y a ajouté celles de quelques entomologistes de Londres, je publie aujourd'hui le Catalogue des espèces de ma propre collection, en y ajoutant les espèces de Clérides provenant de l'île de Cuba, que m'avait communiquées M. le docteur Gundlach, ainsi que celles du Mexique, qui sont uniques dans la collection de M. Auguste Sallé et qu'il m'a prié de décrire; c'est à sa générosité que je dois une grande partie de celles que je possède de ce dernier pays qu'il a longtemps exploré. Les espèces étrangères à ma collection seront désignées par un astérisque placé en avant des patries.

Ces jolis insectes ont été de tous temps recherchés des entomologistes, aussi en trouve-t-on décrits dans presque tous les ouvrages.

Klug est le premier qui ait publié une sorte de monographie des Clérides².

Dans cet ouvrage, il décrit ou cite 50 espèces et en mentionne 39 qu'il n'a pas connues.

Deux planches mentionnent 32 figures d'espèces de genres divers.

Quatre espèces ont été publiées par moi dans mes deux centuries de Coléoptères du Mexique, en 1833, 1834 et 1835.

Dans *la Revue zoologique* de Guérin-Méneville, de 1842,

1. Nomenclature of Coleopterous insects in the Collection of the British museum, partie iv, Cleridæ pages 1 à 68 inclus.

2. Versuch einer systematischen Bestimmung und Auseinandersetzung der Gattungen und arten der Clerii, in 4° 1842.

j'ai donné la description de 12 espèces de Clérides, de l'Afrique australe, que m'avait adressés M. Drège, pharmacien voyageur; parmi les *Notoxus* douteux, décrits sous ce nom, il s'en trouvera qui, sans doute, doivent faire partie des genres *Opilo* et *Axina*.

Dans les *Annales de la Société entomologique de France* de 1843, j'ai publié 24 espèces dont il sera question dans ce Mémoire, en raison de la validité de quelques-unes qui a été contestée.

L'un des ouvrages les plus étendus, à l'époque où il a paru, est la Monographie de feu Spinola, sur cette intéressante famille¹.

L'auteur, homme de beaucoup d'esprit et de savoir, qui parlait et écrivait notre langue avec une pureté parfaite, n'en a pas moins fait une œuvre difficile à étudier; les espèces y sont décrites sous un nom, et les figures en portent souvent un autre; ensuite, il a multiplié à l'infini comme variétés certaines espèces, et tout est à vérifier de nouveau.

Je sais bien qu'il existe de grandes difficultés par rapport aux *Trichodes*, par exemple, et plus particulièrement au *T. favarius*, dont certaines variétés habitent l'Europe australe, l'Asie Mineure et l'Égypte. Je crois à plusieurs espèces confondues sous ce nom. Tant qu'on n'aura pas étudié sur place les mœurs de ces insectes, et les variétés que chacune d'elles peut subir, on restera dans l'incertitude à leur égard.

J'établis par des comparaisons celles qui m'ont semblé devoir être maintenues comme espèces dans ce grand genre *Trichodes*.

M. J.-O. Westwood, en 1834, a donné, dans les *Proceedings of the zoological society of London*, la description des Clérides d'Asie, d'Afrique et d'Australie; quatre plan-

1. Essai monographique sur les Clérites 1844, 2 vol. in 8°, avec 47 planches.

ches chargées de figures, viennent enrichir cette intéressante publication.

Bohemian, *Insecta Caffrariae*, 1851, pages 483 à 519, nous donne une liste nombreuse d'espèces nouvelles recueillies par le célèbre voyageur Wahlberg; je n'ai reconnu aucune de ces espèces, mais en revanche plusieurs de ma collection se sont trouvées être nouvelles.

M. J. Thomson¹ a donné la diagnose de 30 espèces nouvelles, je suis redevable à ce collègue, d'espèces nouvelles échangées entre nous.

Je ne puis qu'exprimer ma profonde gratitude à M. de Mniszczek, qui apprenant mon intention de m'occuper à nouveau des Clérides, à mis généreusement à ma disposition bon nombre de doubles de sa riche collection en cette famille.

Je profite de cette publication pour engager les entomologistes à me procurer des espèces ne figurant pas dans mon catalogue; je possède de bons doubles que je pourrai leur offrir en retour des leurs.

CATALOGUE DES GENRES ET ESPÈCES,

AVEC RECTIFICATIONS SYNONYMIQUES².

CYLIDRUS Lat. Fam. Nat. 1825, p. 354.

- | | |
|--|--------------|
| 1. <i>Cyaneus</i> , Fab. Mant. Ins. 126. Spin. Mon. I, p. 85, t. I. fig. 3. | Madagasc. |
| <i>Cæruleus</i> , Dj. Cat. 3, p. 125. | Ins. Maurit. |

1. Musée scientifique, 2^e liv. p. 46 à 67 — 1860 : Matériaux pour servir à une monographie nouvelle des Clérites.

2. *Nota* : Les espèces marquées d'un astérisque, décrites par l'auteur, ne font pas partie de sa collection, et appartiennent à divers entomologistes, cités aux descriptions.

2. *Fasciatus*, Cast. Rev. Silb. 4, 35. — Spin. I, p. 88,
t. I, fig. 2. Madag.
3. *Wallacei*, J. Thoms. Mus. Sc. p. 47. Bornéo.
4. *Pallipes*, Chv. (ind.). Cat. Brit. Mus. 4. White. —
p. 1. (4). Ind. or.

Cat. Gemm. Har. VI, p. 1722.

5. *Alcyoneus*, Pasc. J¹ Ent. 4-1860, p. 44. Nov. Guinea.
6. *Vescoi*, F. Rev. Zool. 1849, p. 361. Taïti.

DINOPS Stev. Bul. Mosc. I. 1829, n. 4, p. 65.

1. *Albofasciatus*, Charp. Hor. Ent. 4-198, t. VI, fig. 3.
Europa.

Longicollis, Stev. bul. Mosc., p. 67, t. II, fig. 1. 1829.

Personatus, Arag. De quib. Col. 1830, p. 41.

Agilis, Luc. An. Fr. 1845. Bull. n. 23. Algeria.

MACROTELUS Kl. Abh. Berl. Ac. 1842, p. 274.

Elasmocerus J. Lec. Monophylla Spin.

1. *Terminata*, Say. Bost. J¹. 4-160. — Spin. Mon. 2,
p. 126, t. VI, fig. 3. Amer. Sept.

Megatomus, Sp. Mon. 4-385, t. XXVI, fig. 5, Lec. Sy.
3-128.

- 2? *Cinctipennis*, Chv. (2*). Cuba.

CLADISCUS Chv. An. Fr. 1843, p. 33.

1. *Strangulatus*, Chv. l. cit. Ins. Philipp.

Sanguinicollis, Spin. Mon. 4-125. Lac. gen. Atl. 4-45,
fig. 4.

2. *Hindostanus*, Chv. (3). Sylhet.

TILLUS Ol. Ent. 2-1790, n° 22.

Tilloides Cast.

1. *Senegalensis*, Cast. An. fr. 1832, p. 399.

Pubescens, Cast. Rev. Silb. 4-1836, p. 37.

Sp. Mon. I, 99, t. III, fig. 3. Senegalalia.

Rubricollis, Guer. Ic. Reg. An. t. XV, fig. 8. Kl. Mon.
274.

- Hanneli, Petit. Cat. Dej. 3, p. 126.
2. *Leucomelas*, Chv. (4). Mexico.
 3. *Succinctus*, Spin. Mon. I, p. 100, t. III, fig. 4. Ind. Or.
 4. *Transversalis*, Charp. Hor. Ent., p. 199, t. VI, fig. 2. Bengal.
- Unifasciatus*, Rossi. fn. Et. 4-138. Europ. Mer.
- Myrmecodes*, Hoff. Col. Dej.
- Var. *Unifasciatus*, Ol. Ent. 4-76-17, t. II, fig. 24. C. Algiria.
5. *Unifasciatus*, Fab. Mant. Ins. 4-125. — Spin. Mon. I, p. 96, t. II, fig. 4. M.
- Fasciatus*, Four. Ent. Par. 4-136. Var. b.
- Formicarius Minor*, Sulzer Gesch. Ins., p. 42, t. IV, f. 13, a. b. Asia min.
- Serraticornis*, Vill. Ent. 4-222. Diarbekir.
6. *Elongatus*, ♂ ♀ Lin. Sy. Nat. ed. 10, p. 377. Sp. Mon. I, p. 94, t. II, f. 2. Europa.
- Cæruleus*, Voet. Col., t. LXI, fig. 4.
- Var *Ambulans*, ♂ ♀ Fab. Mant. I, p. 93. Sp. Mon. 4-95.
- Ater* Panz. pr. Germ. 8-9.
- Aterrimus*, Esch. Mem. ac. Pet. VI. 1818, p. 459.
- Bimaculatus*, Don. Hist. Br. Inst. XII. 50.

PALLENIS Cast. Rev. Silb. 4-1836, p. 39.

1. *Fulvescens*, (Mots.) Chvt. (5). Ind. Or.
 2. *Acutipennis*, Cast. Rev. Silb. l. cit. Kl. Mon., p. 278. Madag.
- Spin. Mon. I, 108, t. IV, f. 4.
- Joannisi, Petit Cat. Dej. 3, p. 126.

STENOCYLIDRUS Spin. Mon. 2-1844, p. 129.

1. *Azureus*, Kl. Ins. Mad., p. 158, t. III, f. 6. Spin. Mon. 4-128, t. VII, f. 2. Madag.

CYMATODERA Gray. Griff. An Kingd. Ins.

Priocera Say. I, 1832, p. 375.

1. *Hopei*, Gray. l. cit. Spin. Mon. 141, t. IX f. 5.
Mexico.
2. *Pallidipennis*, Chv. Mag. Zool. 1843, p. 8. Id.
3. *Discoidalis*, Chv. Col. Mex. 1843, p. 14. Id.
4. *Cylindricollis*, Chv. Col. Mex. I, Cent. 1833. Sp. Mon. I, p. 148, t. X, f. 3. Mexico.
- Brunneus, Dej. Cat. 3, 126.
- Var. *Westwoodi*, Chv. (indesc.).
5. *Geniculata*, Chv. (7*). Guatemala.
6. *Angustata*, Spin. Mon. I, 149, t. VII, f. 1. California.
Esch. Cat. Dej. 3, p. 126. Mariposa.
7. *Balteata*, Lec. proc ac. Phil. VII. 1854, p. 81. Texas.
8. *Brunnea*, Melsm. proc. ac. Phil. 2-306. Ohio.
Cancellata, Lec. id. VII-81.
Cratægi, Bland. pr. Ent. Sc. Phil. 1-356. Texas.
9. *Puncticollis*, Bland. Proc. Ent. sc. Phl., 1-356. Id.
10. *Ovipennis*, Lec. pr. ac. Phil. 1858, 71. California.
11. *Undulata*, Say. II. ac. Phil. V-174. Am. Sept.
Longicollis, Spin. Mon. 1-147, t. X, f. 4.
Var. *Bosci*, Chv. An. fr. 1843, p. 31.
12. *Melazona*, Chv. (6). Nov. Grenate.

PRIOCERA Ky. Tr. Lin. Sc. XII, 1818, p. 389.

1. *Variegata*, Ky. loc. cit. — Spin. Mont. 1-116, t. IV, f. 2. Brasilia.
2. *Marginicollis*, Chv. An. fr. 1843, p. 31. Id.
3. *Spinosa*, Fab. Sys. El. 4-280. — Kl. Mon. 284. Id.
Sexpunctata, Cast. Rev. Silb. 4-36.
- Decorata, Spin. Mon. 1-120, t. V, f. 1. — Dej. Cat. 3, p. 125.
4. *Cinctiventris*, Chv. An. fr. 1843, p. 32. Brasilia.
5. *Hypocrita*, Chv. (8). Id.
6. *Flavoguttata*, Ch. 9. Yucatan.
7. *Castanea*, New. Ent. Mag. V, 380, — Lec. Syn. 47.
Amer. Sept.

Maculata, Zieg. pr. ac. Phil. 2, 268.

Rufescens, Spin. Mon. 4-119, t. IV, f. 3. — Dej. Cat. 3-126.

8. *Pustulata*, Spin. Mon. 4-118, t. IV, f. 4. Mexico.

AXINA Ky. Tr. Lin. Soc. XII-1818, p. 389.

1. *Anatis*, Ky. loc. cit., p. 391, t. XXI, f. 6. — Spin. Mon. I, 423, t. V, f. 2 ♂. Brasilia.

2. *Chinensis*, Fab. Ent. Sys. 4. App. 444. Cap. B. Sp. Marmoratus, Chev. Rev. zool. 1842, 277. Kl. — Mon. 308 et 379. Nota — 3. Dej. Cat. 3, p. 126.

Capensis, Spin. Mon. 4-197, t. XV, f. 2.

3. *Retrocincta*, Chv. (10). Cap. B. Sp.

4. *Sobrina*, Chv. Rev. zool. 1842. 277. Id.

PHLOEOCOPUS. Guérin Ic. Reg. An. 1846, p. 44.

1. *Tricolor*, Guer. loc. cit.. p. 54. — Spin. Mon. I, 338, t. XVII, f. 1. Senegalia.

Interruptus, Kl. Mon. 323.

Lelieuri, Petit Cat. Dej 3, p. 127.

OPILO, Lat. Hist. nat. Crust Ins. 3-1802, p. 444.

1. *Gigas*, Cast. Rev. Silb. 4-12. Spin. Mon. I, 218, t. XIX, f. 1. Senegalia.

Tropicus, Kl. Mon. 322. Senegalia Sennaar.

2. *Cinctus*, Kl. Mon. 322. Seneg.

3. *Nigrites*, Chv. (11). Africa.

4. *Tuberculicollis*, Chv. (12). Natal.

5. *Subfasciatus*, White Cat. Cl. Mus. 4, p. 56. Bengal. West. Proc. Zool. Soc. 1852, p. 41, t. XXV, f. 10.

6. *Ephippiger*, White loc. cit. 57. Nov. Holl.

7. *Variipes*, Chv. (13). Sydney.

8. *Domesticus*, St. fn. XI, p. 16. t. 229, fr. P. Europa.

9. *Mollis*, Lin. Fn. Sv. 1761-186. id.

Subfasciatus, Zieg.

10. *Pallidus*, Ol. Ent. 4-76, p. 41, t. I. f. 2. Italia.

Centromaculatus, Villa Ent. col. 1844.

Var. *Germanus*, Chv. An fr. 1843, p. 37.

Germ. Algeria.

11. *Præustus*, Chv. (14). Lac N'Gami.

12. *Punctipennis*, (Frc) Chv. (15). Chili.

NATALIS Cast. Rev. Silb. 4-1836, p. 40.

1. *Porcata*, Fab. Mant. Ins. I, p. 127. — Spin. Mon. I, p. 201, t. XVI, f. 2. Nov. Holl.

Heros, St. Cat. 1843, p. 82.

2. *Cibricollis*, Boisd. Voy. Ast., p. 140. — Spin. Mon. I, p. 203, t. XVI, f. 4. Nov. Holl.

TILLICERA Spin. Mon. I. 1844, p. 157.

1. *Chalybæa*, White Cat. Br. Mus. 4. 1849, p. 51. — West. proc. Zool. Sc. 1852, p. 41 t. XXIV, f. 5. Tenasserim.

SALLEA Chv. Nov. Gen. 1.

1. *Necrobioides*, Chv. (16). Guatemala.

2. *Rubripennis*, Chv. (17*). Mexico.

3? *Bicolor*, Chv. (18*). Mexico.

DERESTENUS Chv. Mag. Zool. Ins. 1843 p. 43.

1. *Nigrifrons*, Chv. (20). Oaxaca.

2. *Distinctus*, (Pilate) Chv. (19). Yucatan.

3. *Orthopleuridus*, J. Thoms. Mus. Sci. 2-1860, p. 57. Mexico.

4. *Lateralis*, Chv. (21*). Id.

5. *Mutabilis*, Chv. (22*). Id.

6. *Vittipennis*, Chv. (23*). Id.

7. 4. *Lineatus*, Chv. loc. cit. p. 14, t. 108, fig. 1. a. b. Lac. Atl. t. 46, fig. 2. Mexico.

Similis J. Th. Mus. Sci. 2, 1860, p. 57, ♀ id.

1. Rapporter à ce genre le *Serriger Coffini*, Cat. B. mus 4 p. 53.

CLERONOMUS, Kl. Mon. 1842, p. 282.

Phonius, Chv. Mag. Zool. 1843, p. 12.

1. *Amœnus*, Spin. Mon. I. p. 131, t. 7, fig. 2. Mexico.

2. *Sanguinipennis*, Chv. loc. cit. p. 12, t. 107, fig. 12. Id.

3? *Cyanipennis*, Kl. Mon. 307. Id.

Dasytoides White Cat. Br. Mus. 4, 1849-50, Var.

THANASIMUS Lat. Gen. I. 1806, p. 270.

Allonyx J. Duv. **Pseudoclerus** J. Duv.

1. *Mutillarius*, F. sy. Ent. 157, — Spin. Mon. I. 185, t. 17, fig. 4, T. Europa.

Fasciatus, Geoff. Ins. I. Supp. 536.

Formicaroides, Schrank Beyt. p. 65. Id.

2. *Formicarius*, Lin. Fn. Sv. 1761, p. 185. — Spin. Mon. I. 187, t. 14, fig. 2, Var. Yucatan.

3. *Nubilus*, Kl. Mon. 386. Lec. Syn. p. 25. Am. Sept. Undulatus, Say. Bost. H. 4, 163, Lec. id. Lac. Sup. Abdominalis, Ky. Fn. bor. am. 4, 244, t. 2, fig. 5.

4. *Rufipes*, Brah. Hoppe ent. Taschb. 1797, p. 136, Kl. Mon. 292. Muls An. soc. Lyon. 1863-301. Lapponia.

5. *Dubius*, Fab. Gen. Ins. Mant. 229. Amer. Sept. Ruficeps, Spin. Mon. I, 189, t. 14, fig. 2. Dej. Cat. 3, 127.

Erythrocephalus, Winth. Cat. Dej. 3, 127.

6. *Melanocephalus*, Chv. (24). Nov. Scotia.

7. *Quadrivaculatus*, Schaller Act. Hall. I. p. 288. Belgia. Spin. Mon. I-192.

8. *Sellatus*, Westw. Pr. Zool. Sc. 1852, p. 42, t. 25, fig. 8. Ind. or.

9. *Eximius*, White Cat. Br. Mus. 4-1849 p.63. Westw., Pr. Zool. 1852, p. 54, t. 27, fig. 12. Hunter River.

CLERUS, Geoff. Hist. Ins. env. de Paris.

1-1760, 303.

= Prothorax tomenteux sans bandes transverses.

1. *Quadrinotatus*, Chev. Mag. Zool. 1843, p. 22. Mexico.
2. *Obliquevittis*, Chv. (25). Id.
3. *Mutabilis*, Chv. (26). Id.
= Prothorax tomenteux, convexe, offrant une bande transverse.
4. *Silbermanni*, Chv. Mag. Zool. 1843, p. 21. Mexico.
5. *Assimilis*, Chv. loc. cit. p. 17. Id.
6. *Semiochraceus*, Chv. (27). Id.
7. *Indagator*, Chv. (28). Venezuela.
8. *Paraensis*, Chv. (29). Para.
9. *Bombycinus*, Chv. Col. mex. 1. fas. 1833. — Kl. Mon. 295. Mexico.
Aeneicollis, Spin. Mon. 1, 254, t. 24, fig. 1. Dj. Cat. 3, p. 127.
10. *Venator*, Chv. Mag. Zool. 1843, p. 18-1. Mexico.
Lesueuri, Spin. loc. cit. 249, t. 23, fig. 2, 1844.
11. *Sphegeus*, Fab. Man. Ins. 1-123. — Spin. Mon. Loc. cit. 270, t. 27, f. 1. Oregon.
12. *Ichneumoneus*, Fab. Gen. Ins. Mant. 230, Spin. Mon. loc. cit. t. 16. f. 6. Caroline.
Rufus, Ol. Enc. meth. VI. p. 13. — Spin. loc. cit. 252. t. 24, f. 3. Texas.
13. *Miniacetus*, Bld. voy. d'Orb. t. 9, f. 1. Brasilia. Mer.
14. *Meridanus*, Chv. (30). Yucatan.
- 14 bis. *4-Nodosus*, Chv. (31). Mexico.
15. *Zebra*, Chv. loc. cit. p. 23¹. Id.
= Prothorax tomenteux, convexe, orné de trois bandes.
16. *Mexicanus*, Cast. Revue Silb. IV, p. 44. — Spin. Mon. t 1-248, t. 27, f. 2. Lec. Syn. 21. Mexico.
17. *Nigromaculatus*, Chv. Mag. Zool. 1843, p. 20. Id.
18. *Torquatus*, Chv. (32). Guyane.

1. Le type a le prothorax sans bande.

- = Prothorax tomenteux, convexe, offrant deux bandes noires.
19. *Socius*, Chv. (36). Guyane.
- = Prothorax moins convexe, à demi-glabre, n'offrant qu'une bande.
20. *Scenicus*, Kl. Mon. p. 295. Brasilia.
21. *Lunatus*, Sp. Mon. 1. 250, t. 24, 2. Amer. Sept.
Bicolor, Mels. Pro. ac. Phi. 2, 307.
Rufulus, Dej. Cat. 3-425.
22. *Nigripes*, Say. J. Ac. Phil. 3-191. Spin. Mon. loc. cit.
203, t. 25, f. 3. Id.
23. *Nigrifrons*, Say. loc. cit. 190, Lec. Syn. 23. Id.
24. *Faber*, Chv. (33). Para.
25. *Decussatus*, Kl. Mon. 290. Mexico.
Hopfneri, Spin 1, 256, t. 25, f. 4, Dj. Cat. 3, p. 127.
- = Prothorax idem sans bande.
26. *Rosmarus*, Say. loc. cit. 190, Klug. Mon. 293.
Amer. Sept.
27. *4-Signatus*, Say. Bost. J. 1, 162, Klug. Mon. 293. Id.
28. *Rufiventris*, Spin. Mon. 1. t. 23, f. 3. Dj. Cat. 3.
p. 127. Amer. Sept.
29. *Ruficollis*, Cast. Rev. Silb. 4-45. — Spin. Mon. loc.
cit. 260, t. 26, f. 2. Guyana.
Histrio Dej. Cat. 3-127.
- = Corps noir en dessus, Élytres jaunes, avec trois
bandes et une tache apicale à l'extrémité.
30. *Simulans*, Chv. (34). Guyana.
31. *Miniatus*, Spin. Mon. loc. cit. 2, 139, t. 47, f. 2.
Bras.
32. *Annulatus*, Esch. Entomog. 1, 1822, p. 50, Kl.
Mon. 300. Id.
Variegatus, Spin. loc. cit. 250, t. 23, f. 4. Id.
Myops. Dej.
Espèces anormales.
33. *Viduus*, Kl. Mon. 297. Mexico.

- Erythrogaster Spin. Mon. 1-272, t. 27, f. 3.
34. *Abdominalis*, Chv. Col mex. 1834, 1 fasc. Id.
Zonatus, Kl. Mon. 297.
35. *Nigrocinctus*, Kl. Mon. 291. Id.
36. *Eximius*, Mannh. bul. Mos. 1843-2-248. California.
Holosericeus, White Cat. Br. Mus. 4, 1849-58.
= Espèce Africaine.
50. *Scapularis*, Chv. (43). Natal.
= Espèce Australienne.
51. 9-*Guttatus*, West. pr. Zool. Soc. 1852, p. 49.
Hunter River.
= Corps noir en dessus, élytres ayant un point au milieu de la base et deux taches latérales jaunes.
37. *Sanguinipes*, Chv. (35). Mexico.
= Corps idem, élytres à point basal et trois taches ou bandes.
38. *Sobrinus*, Cast. rev. Silb. IX, p. 45, Kl. Mon, 385, —
Spin. Mon, 1-211, t. 22, f. 4. Nov. Grenada.
Brasilia.
39. *Tricinctus*, Chv. (36). Para.
= Corps idem, élytres avec trois bandes obliques, jaunes.
40. *Pulchellus*, Kl. Mon., p. 263, 1842¹. Brasilia.
Obliquefasciatus, Chv., An. Fr., 1843, p. 32.
= Corps idem, élytres avec un point basal, une bande médiane jaune, à extrémité cendrée.
41. *Flavosignatus*, Sp. Mon., 1-233, t. 27, f. 3. Brasilia.
= Corps noir, élytres avec un trait huméral et deux taches jaunes, extrémité cendrée.
42. *Pilatei*, Chv. (37). Yucatan.
= Corps idem, élytres à tache basale, deux ou trois bandes obliques jaunes, extrémité cendrée.

¹. Le *C. Planonotatus* de Castel. est une espèce très-disincte.

43. *Cognatus*, Chv. (38). Para.
 44. *Morosus*, Chv. (39). Brasilia.
 — Noir en dessus, côtés du prothorax rouges.
 45. *Thoraciclus*, Ol. Ent. IV, 76, p. 48, t. 2, f. 22, a, b,
 Spin. Mon., I, 274, t. 26, f. 5. Am. Sep.
 Monilis, Mels. Proc., ac. Phil. 2, 307.
 — Corps noir, bords du prothorax, des élytres, suture
 et écusson blanches.
 46. *Scutellaris*, Chv. (40). Mexico.
 — Corps noir, bords des élytres et commencement de
 la suture blanches.
 47. *Nitidus* Chv. Mag. zool., 1843, p. 24.
 Lævigatus, Spin. Mon., p. 238, t. 21, f. 1. Id.
 — Corps en dessus et poils noirs.
 48. *Immarginatus*, Chv. (41). Nov. Grenada.
 — Dessus d'un noir bleuâtre, élytres offrant au milieu
 une bande blanche oblique formée d'un duvet
 blanc.
 49. *Mollifascia*, Chv. (42). Mexico.

THANEROCLERUS, Spin. Rev. zool., 1841, p. 73.

1. *Buqueti*, Lefebv., An. fr. 1835, p. 582. — Spin.
 Mon., p. 310. Ind. or.
 Sanguinolentus, Dj. Cat., 3-127.
 2. *Sanguineus*, Say Bost. Jl. 4-162. — Spin, Mon. 4-208,
 t. 17, f. 2. Amer. sept.

PLATYCLERUS, Spin. Rev. zool., 1841, p. 75.

Mon. 4, 1844, p. 332.

1. PLANATUS, Cast. Rev. Silb., 4, p. 46. Spin. loc. cit.
 334, t. 28, f. 4. Madag.

AULICUS, Spin. Rev. zool., 1841, p. 74.

Muisca, Spin. Mon. 4, 1844, p. 328.

1. *Instabilis*, New. the Ent., p. 15. Kl. Mon, 341.
 Nov.-Holl.

Var. *Tibialis*, White, l. cit. 60. — Australie.

Var. *Castanipes*, White, Cat. Brit. Mus., IV, p. 60.
V. D. L.

2. *Plutus*, Chv. (44). Aust. S.-O.

3. *Foveolatus*, New. the Ent. Spin. Mon., 1, pl. 15, f. 4.
N. Adelaïde.

Serobiculatus, Spin. Mon. 1, 156.

4. *Corallipes*, Chv. An. *Castanipes* White?
(45). Tasmania.

5. *Chrysurus*, Chv. (46). Australia.

6. *Viridissimus?* Pascoe the ent. 1, p. 47. Id.

7. *Basicollis*, Ch. (47*). Cuba.

8. *Alboguttulatus*, Chv. (48*). Id.

9. *Bilineatus*, Chv. (49*). Id.

10. *Stenochioides*, Chv. *Mexico.

TARSOSTENUS, Spin. mon., 1, 1844, 287.

1. *Univittatus*, Rossi, Fn. Et. 1, 44. — Spin. Mon.,
l. cit., 288, t. 32, f. 3. Europa.

Fasciatus, Curt. Br. ent. VI, 270. — Stev. 34, Br.,
ins. 3-324. Aust. Anglia.

Succinctus, Chv. Rev. zool., 1842, p. 277. Cap. B. Sp.

Albofasciatus, Mels. R. ac. Phil. 2, 306.
Pensylv. Ceylan.

2. *Zonatus*, Bld. Voy. Pôle Sud, IV, p. 62, t. 4, f. 14.
Nouv. Holl.

TROGODENDRON, Guérin, Ic. reg. an. Ins., 1846, p. 53.
Xanthoceros, New pars.

1. *Fasciculatum*, Schreb. Tr. Lin. soc., 1802, VI, p. 195,
t. 20, f. 6. Swan River.

Var. *Minor*, Honestum New. the ent., p. 46. Lac
Gen. Col., IV, p. 454. — Spin. mon., 1, 212, t. 18,
f. 1. Ins. Kargenn.

SCROBIGER, Spin. mon., 1, 1844, p. 230.

Xanthoceros, New. pars.

1. *Splendidus*, New. the Ent., 1840, p. 45. Germ. Lin. Ent., 3-186. Swan River.
Reichei, Spin. mon., 1, p. 232, pl. 4, f. 1.
2. *Idoneus*, New. loc. cit., 1842, p. 363. Port-Philipp.
3. *Mærens*, Westw. Tr. Sc. Lin., p. 41, pl. 26, f. 50. Adelaïda.

OLESTERUS, Spin. Rev. zool., 1841, p. 74.

Mon., 1, 1844, p. 226.

1. *Cruentatus*, Chv. (50). Australia.

ZENITHICOLA, Spin. Rev. zool., 1841, 74.

Mon., 1, 1844, 284.

1. *Australis*, Boisd. Voy. astr. Col. 142. — Spin. loc. cit., p. 286., t. 28, f. 2. Lac. Gen. atl., t. 46, f. 3. Aust.
2. *Obesus*, White, Stoke, Voy. app., t. 1, f. 9. Id.
3. *Funestus*, (Schaff.) Chv. (51). N. S. Wales.
4. *Sosius*, Chv. (52). Adelaïda.

TRICHODES, Herbst, Naturg. Kae. IV, 1792, 134.

Pachyscelis, Hope.

== Espèces américaines.

1. *Ornatus*, Say. Journ. Ac. Phil., 3, p. 189. Spin. mon., 1, 327, t. 31, f. 5. Mont. Roch.
2. *Tenellus*, J. Lec. pr. ac. Phil., 1858, p. 72. California.
3. *Bisignatus*, Lec. California.
4. *Nutalli*, Ky., Tr. Lin. Sc. XII, p. 394. — Spin. Mon. 1-317, t. 37, f. 2. Missouri.
Humeralis, Dj. Cat., 3-136.
5. *Apivorus*, Germ. Sp. 1-81. — Spin. mon., 1, 1826, p. 307, t. 31, f. 4. Amer. sept.
Nutalli, Say. Bost., jl. 1-164.
Cribripennis, Dej. Cat. 3-126.
Trifasciatus, St. Cat., 1-59, t. 1, f. 6.

6. *Bibalteatus*, J. Lec., jl. ac. Phil, 4-18. Texas.
 — Espèces de l'Afrique australe¹,
7. *Dregei*, Chv. (53). Cap. B.-Sp.
 — Espèces de pays divers.
8. *Irkutensis*, Laxm. Nov. comment. ac. imp. Petr., 1770,
 XIV, 1-395, t. 24, f. 4. Siberia.
Bifasciatus, Fab. Sp. ins., 1-202. — Spin. mon., 1,
 325, t. 32, f. 2.
- Élytres rouges.
- = Espèces à point huméral avec trois bandes bleues
 aux élytres, la dernière apicale.
9. *Sanguinosus*, Chv. Rev. zool., 1861, p. 150. Bogarh.
10. *Zaharae*, Chv. id. p. 152. Sahara.
11. *Leucopsideus*, Ol. Ent., 4, 76, p. 8, t. 1, f. 6. —
 Spin. Mon., 1-325, t. 22, f. 2. Gall. mer. Hispania.
Cerarius, Hoff. Cat. Dej., 3-126. Algeria.
12. *Hypocrita*, Chv., loc. cit., p. 151. Id.
 Élytres rouges ou jaunes, parallèles, tronquées ou
 presque tronquées, offrant trois bandes noires ou
 bleues, dont la dernière petite, apicale.
13. *Olivieri*, Chv., Ic. Reg. an., p. 54, t. 15, f. 10.—An.
 Fr., 1843, p. 38. Persia.
14. *Crabroniformis*, Fab. Mant. Ins., 1, p. 126. — Spin.
 mon., 1, p. 309, pl. 34, f. 3. Syria.
 Var. *Lepida*, Brullé. Exp. mor., 3, p. 154, t. 37 f. 9.
 Græcia.
15. *Rufitarsis* (Gebl.) Chv. (54). Caucasus. As. Min.
16. *Zebra*, Fald Nov. Mem., Mosc., IV, p. 207, t. 7, f. 3.
 Pers. occ.

1. Le Tr. Aulicus, Kl. mon 338, me paraît différer de l'Aulicus Spin. mon 1-320 f. 31 f. 4. Trois espèces existeraient donc au cap de Bonne-Espérance.

17. *Sinae*, Chv. (55). China bor.
Élytres légèrement aplaniés, un peu élargies vers l'extrémité.
18. *Gulo* (Parr.) Chv. (59). Ins. Jon.
= Élytres arrondies à l'extrémité.
19. *Lasertei*, Chv., An., p. 1843, p. 39. Schm, Bert. zeit.
1861, 214. Turcia.
20. *Favarius*, Ilig. Mag., 1, p. 80, Klug. Mon., 332.
Germania, Styria, Hung.
21. *Syriacus*, Spin. Mon., pl. 20, f. 6. (Tabula Sola.)
Syria.
Olivieri, Kl. Mon., 330.
Klugii, Kraatz., Berl. Zeit.
22. *Viridifasciatus*, Chv., An. fr., 1843, p. 40. — Spin.
Mon., t. 31, f. 1, a a. Oriens, Turcia.
Schm. Berl., zeit, 1861, p. 214. Ægypt.
23. *Caucasicus*, Chv. (56). Caucas. As. Diarbekir.
Corps vert, rugueusement ponctué, à longue villosité blanche en dessous, élytres offrant sur chaque côté trois taches transverses jaunes.
24. *Sexpustulatus*, Chv. (57 *). Syria.
= Élytres convexes.
25. *Apiarius*, Lin. Sys. nat., t. 2, f. 20. Europa.
Var.? *Crassipedarius* Dahl. cat. Villa, p. 34. Hungaria.
Interruptus, Meg. Dej. cat. 3, 126. id.
Unifasciatus, Dahl. Cat. id.
26. *Georgianus*, Chv. (58). Georgia.
= Élytres rouges avec trois bandes vertes, dont la dernière n'est séparée du bord apical que par un mince liseré.
27. *Affinis*, Chv. an. p. 1843, p. 38. — Schm. Berl. Zeit
1861, 215. Ægyptus.
Var. min. *subapicalis* Chevr. Syria.
= Élytres rouges offrant trois bandes d'un bleu (A. Chevrolat.) 2

- noir, liées entre-elles par la suture, dernière située avant le sommet.
28. *Alvearius*, F. Ent. sy. 4-209; — Spin. Mon., 4-301, t. 29, f. 5. Europa.
 Var. *Fasciis duabus medio interruptis*. Dahl. Spin. Mon., 4-300, t. 29, f. 4. Sard. Corsica.
29. *Umbellatarum*, Ol, Ent. 4-76, p. 5, t. 4, f. 2. a. b.
 — Spin. mon., 4-298, t. 29, f. 3. Barbaria.
 = Élytres rouges, avec deux bandes bleues; première en forme de selle, liée à l'écusson par une tache carrée, arrondie en dessus, séparée de la marge; deuxième étroite, située avant le milieu.
30. *Ephippiger*, Chv. (59). Asia, Diarbekir.
 = Élytres rouges à points bleus.
31. *Octopunctatus*, Fab. mant. Ins. 1, p. 126; Spin. mon. 1, p. 207, t. 29, f. 2. Eur. mer.
Octomaculatus, Vill. Ent. 1, p. 222, t. 4, f. 26.
 = Élytres rouges, planes, offrant 2 points, 1 sur l'épaule, 1 au milieu de l'étui, 1 bande transversale et 1 apicale, noirs.
32. *Kindermanni*, Chv. (60) Diarbekir.
4-Maculatus, Kind. Syria.
 = Élytres id., avec trois bandes bleues réunies par la suture, 1^{re} anchoriforme, 4^e apicale.
33. *Carceli*, Chv. An. fr. 1813, p. 34; Sch. Berl. Ent. Zeit. 1861, p. 215. Anatolia.
 Sch. Berl. Zeit. 1861, p. 215.
 = Élytres id., avec 3 bandes et une tache scutellaire vertes.
34. *Axillaris* (Geb.), Fisch, cat. col. Karl, 1823, p. 9.
 bull. mon., 1844, t. p. 39. Songoria.
Insignis, Stev.
 = Élytres vertes ou bleues, étroites, allongées, aplaniées, offrant deux demi-bandes latérales d'un rouge vermillon.

35. *Quadriguttatus*, Ad. Mem. Mos., v. p. 313.
Mar. Casp. Syria.
- Quadripustulatus*, Brul. Exp. Mor. 3-156, t. 37,
f. 10, Dej. cat, 3 p. 126. Græcia.
- 4 punctatus, Fisch. Caucasus.
- = Élytres vertes un peu plus larges, avec quatre taches jaunes, la première liée à la marge jusque sous l'épaule.
36. *Subfasciatus* (Fald), Kraatz, Berl. Zeit. 1873, p. 229.
Persia.
- = Élytres vertes, un peu plus convexes, avec 4 ou 6 taches, dont la mediane est liée à la marge et remonte jusqu'au dessous de l'épaule, femelle émettant au sommet de la jambe postérieure une longue et étroite lamelle.
37. *Angustus*, ♂ Chv. an. fr. 1843, p. 41 ; Sch. Berl. Zeit. 1861-225. Natolia.
- Laminatus, ♀ Chv., loc. cit., p. 40 ; Sch. id.
- = Élytres vertes, raccourcies, épaisse, avec six taches rouges, médiane liée à une ligne marginale qui remonte au haut de l'étui.
38. *Atticus*, Chv. 65. Ins. Ionn.
- = Élytres plus ou moins épaisse, allongées, jaunes, rouges ou vertes, offrant trois bandes bleues, la première liée le plus souvent à l'épaule et par la suture à l'écusson.
39. *Ammios*, Fab. Mant. l. 120 ; Spin. Mon. 1, p. 322, t. 32, f. 1. Algeria, Hispania.
40. *Flavicornis*, Germ. fur Int. 20, 4 ; — St. cat. 1843, p. 83. Sicilia.
- Dauci, Helfer, St. cat. (66).
41. *X. littera*, Chv. (62). Algeria.

CALENDYMA, Lac. gen. col. 4-1857, p. 460.

Polycaon, Cast., Hist. n. 1, 283.

1. *Chilensis*, Cast. Hist. n. loc. cit. 4-283; — Lac. loc. cit. atl. t. 46, f. 6. Chili.
Bizonatus, Bl. voy. d'Orby, p. 89. Bolivia.
Viridifasciatus, Lac. cat. Dj. 3, p. 125.
- CHALCOCLERUS, Spin. 1
Xanthoceros, New. pars.
1. *Medianus*, ♂ White. Cat. B. M. New Gall.
Accinctus, ♀ New. the Ent. 364.
- 2, *Pulcher*, New the Ent. 4, p. 16; Klug. mon. 388. Adelaïda.
Fulgens, Chev. an. fr. 1843-44.
Bimaculatus, Sp. mon. 4; p. 281, t. 20, f. 4.
- ELEALE, New the Ent. 1841, p. 36 (2)
Xylotretus, Guerin,
Xanthoceros. New. Pars.
1. *Simplex*, New. the Ent. p. 16; — Klug. mon. 388. Adelaïda.
Leucapsis, ♀ Germ. Lin. Ent. 3-186.
2. *Speculum*, Chv. (63). Van D. Land.
3. *Herbea*, Chv. (64). Australia.
4. *Alboscutellata*, Chv. 69. (65). Van. D. Land.
5. *Tasmaniæ*, Chv. (66). Tasmania.
6. *Chrysidea*, West. Proc. Zool. Soc. 1852, p. 50. King. Georg.
7. *Semichrysea*, Chv. (67). Australia.
8. *Viridis*, Guerin, Ic. Reg. an. p. 32; — Spin. mon. 4, p. 153, t. 6; f. 2. Id.
9. *Anormis*, Chv. (68). Swan. riv.
10. *Brevicornis*, Chv. (69). Australia.
11. *Lanata*, Chv. (70). V. D. L.

1. *C. intricatus* Kl. mon 4 (v. D. Land), est indiqué comme se rapportant à ce genre.

Le *Cl. pentomelas* Boisd. appartient aussi à ce genre.

12. *Latecincta*, ♂ ♀, Chv. 76. (71). Swan river.
 13. *Disparipes* ♂ ♀. (72). Id.

EPICLINES. Chv. Ic. Reg. an. Ins. 1846, p. 49.

1. *Gayi*, Chv. loc. cit. p. 50; Mag. zool. cl. IX, p. 41,
 t. 234, fig. 1; H. Bl., voy. d'Orby, p. 95. Chili.
 2. *Basalis*, Bl. voy. d'Orby, Ent. 96; — Spin. in Gay,
 hist. Chili, IV, 367, tab. f. 2. Id.

Et var.

STIGMATIUM, Gray, Griff., Anim., Kingd., Ic.
 1-1832, p. 375.

1. *Thanasimoides*, Chv. (73). Malacca.
 2. *Granulosum*, Westw. Proc. zool. soc. 1855, p. 22,
 t. 38, f. 4. Singapoore.
 3. *Cicindeloides*, Gray, loc. cit., p. 376; — Spin. mon 1,
 t. 48, f. 2. Singapoore.
 Spin. mon. 1-179, t. 43, f. 4.
 4. *Nebulosum*, Kl. mon. 388; Spin. mon. 2, 133, t. 15,
 f. 6. Java.
 5. *Basipes*, Chv. (74). Java.
 6. *Dimidiatum*, Chv. (75). Cochinchina.
 7. *Ignavum*, West., l. cit. p. 20, t. 30, f. 2.
 Singapoore.
 8. *Nitidiceps*, Chv. (76). Dorey.
 9. *Leucochile*, Chv. (77). Siam.
 10. *Basipenne*, Chv. (78). Borneo.
 11. *Ambulator*, West., Proc. zool. soc. 1855, p. 23, t. 38,
 f. 5. Singapoore.
 12. *Speculare*, et Var. White., cat. Br. Mus. 4, p. 54.
 Pt. Essington, V. D. Land. Swan river.
 13. *Fasciatoventre*, Chv. (79). Moreton bay.
 14. *Flacescens*, Chv. (80). New. Gall. S.
 15. *Linealba*, Chv. (81). Moreton bay.
 16. *Pallipes*, Chv. (82). Borneo.
 17. *Miserum*, Ch. (83). Australia.

OMADIUS, Cast. Rev. Silb. IV-1836, p. 48.

1. *Semicarinatus*, Chv. (84). Malacca.
2. *Indicum*, Cast. loc. cit. 49; — Spin. mon. I. 175; t. 13, f. 1. Java.
- Prolixus, Kl. Mon. 287.
- Javanus, Dj.. Cat. 3-126.
3. *Seticornis*, West. Proc. Zool. soc. 1855, p. 25, pl. 38, f. 4. Philipp. Singapoort.
4. *Trifasciatus*, Cast. loc. cit. 49; — Spin. mon. I-176, t. 13, f. 3. Java.
- Modestus, Kl. Mon. 288, t. 1, f. 2.
5. *Nigropunctatus*, Chv. (85). Cambodge.
6. *Fasciipes*, West. loc. cit. 24, t. 38, f. 9. Malacca. Borneo.
7. *Ctenostomoïdes*, West, loc. cit. 24, t. 38, f. 8. Singapoort.
8. *Annulipes*, Chv. (86). Malacca.
9. *Pictipes*, Chv. (87). Nov. Guinea.
10. *Olivaceus*, West. loc. cit. p. 44, t. 26, f. 3. Insul. Wales.
11. *Prasinus*, West. loc. cit. p. 53, t. 26, f. 2. Morton bay.
12. *Novæguineensis*, Chv. Rev. zool. 1844-75. (88). Nov. Guinea.

EPIPHLÆUS, Spin. mon. I-1844-5.

1. *12-Maculatus*, Kl. Mon. 376, t. 1. f. 16. Brasilia.
Pantherinus, Chv. An. Fr. 1843-35.
- 12-Punctatus*, Sp. Mon. 2 p. 167-36.
2. *Balteatus*, Chv. loc. cit., pag. 36. Id.
3. *Variegatus*, Kl. Mon. 372. Para.
Tomentosus, Spin. mon. 2 p. 13. t. 38, p. 3. Brasilia.
Dj. cat. 3, p. 128.
4. *Setulosus*, J. Thom. Mus. scient. 2-1860, p. 60. Mexico.

5. *Marginipes*, Chv. (89). Mexico.
6. *Lividipes*, Chv. (90). Venezuela.
7. 4-*Stigma*, Chv. (91). Cuba.

PLOCAMOCERA? Sp. mon. 2-1844, 17.

1. *Humeralis*, Sp. mon. 2, 16, pl. 38, f. 5. Para.

LEMIDIA, Spin. Rev. zool. 1841-75.

Mon. 2. 1844-32.

1. *Nitens*, New. the Ent. 36; 14, mon. 311. Tasmania.
2. *Xanthozona*, Chv. (92). Australia.
3. *Flavovaria*, West. loc. cit. p. 62, p. 4, p. 49, pl. 27, f. 3. Australia.
4. *Pulverosa*, Chv. (93). Ind. bor.
5. *Semilutea*, Chv. (94). Ind. bor.

HYDNOCEERA, New. Ent. mag., v 1838, p. 379.

Theano, Chv., An. Fr. 1843, p. 33.

1. *Humeralis*, Say, jl. phil. 3, 1823, 192. — Spin. mon. 2, p. 41, t. 39, f. 2. Am. sept.
Auxillaris, Dej., cat., 3, p. 127.
2. *Rufipes*, ♂, New mag., not. hist., IV, 363. Florida.
3. *Funebris*, Chv. (95). Calif., Mariposa.
4. *Bituberculata*, Chv. (96). Mexico, Yucatan.
5. *Verticalis*, Say Bost jl, 1-164, Lc. Syn., 29. Am. sept.
Curtipennis, Nev. mag. nat. hist. IV, 363. Florida.
Brachyptera, Kl. mon., 313. Am. sept.
- Lineatocollis, Spin. mon., 2-51, t. 40, f. 1. — Dej.
Cat., 3-127. Chv. Am. sept.
6. *Cruciata*, Ann. Chv. Fr., loc. cit. p. 33. Nov-Grenat.
7. 4-*Lineata*, Chv. 101 Yucatan.
8. *Nitidicollis*, Chv. (98.) Mexico.

EPICLINES, Chv. Icon. Reg. an. Guér, 1846, p. 49.

1. *Gayi*, Chv. l. cit. Bld., voy. d'Orb, 93, t. 6, f. 9. Chili.
2. *Basalis*, Bld. loc. cit. p. 96. Spin. in Gay, 4, p. 387, t. 10, f. 2. Chili.

EURYMETOPUM, Bld, voy. d'Orb.¹

Epiclines, cat. Gemm. Har. VI, p. 1741, pars. Thanassimus, Spi. Fairm., An. f.

1. *Nudata*, Spin., Gay, Hist. Chili, IV, p. 400. Chili.
2. *Costicollis*? Spin., loc. cit. 401, t. 9, f. 6. Id.
3. Nov., Sp.? Id.
4. Nov., Sp.? Id.
5. Nov., Sp.? Id.
6. *Proteus*, Spin., loc. cit. 404. Id.
7. *Vittula*, Fairm. Col. Chili, II, p. 3. Id.
8. *Pallens*, Bld, loc. cit. 93. Id.
9. *Fulvipes*, Bld, loc. cit. 93, t. 6, f. 7. Id.
10. *Circumflexum*, Chv. (99). Id.

TENERUS, Cast., Rev. Silb., IV, 1836-43.

1. *Lineatocollis*, Cast., loc. cit. 36, Spin. Mon. 1, p. 167, t. 7, f. 4. Guinea.
2. *Batchianus*, J. Thom. Mus. Sc., 2.60, p. 64. India.
3. *Binotatus*, Chv. (100). Malasia.

ICHNEA, Cast., Rev. Silb., 4, 1836, p. 55.

1. *Religiosa*, Chv. (101). Mexico.
2. *Divisa*, Chv., An. Fr., 1843, p. 37. Brasilia.
3. *Trilineata*, Chv. (102). Mexico.
4. *Circumcincta*, Chv. (103). Id.
5. *Lycoides*, Cast., loc. cit. 35. — Kl. Mon., 375.— Spin. mon. 2, 22, t. 37, f. 3. Brasilia.
- Lateralis, ♀, Kl. Mon., 377, t. 2, f. 13.
6. *Aequinoctialis*, Spin. Mon. 2, p. 25, t. 37, f. 4, 5. Nov-Greneta.
7. *Calceata*, Chv., An. fr., 1843, p. 37. Brasilia.
8. *Mexicana*, J. Thom. mus. Sci. 2, 1860, p. 65. Mexico.

1. Font partie de ce genre, les *Thanasimus impressus*, *costicollis*, *prasinus*, Spin. in. Gay, E. *maculatum*, Bld. voy. d'Orb, p. 92, 315, *Spinolæ*, Gemm. Col. heste VI-1870, *Gayi* Spin. l. cit. p. 398, t. 9 f, le *Cl. longulus*, Sp. mon. 2, p. 138, t. 46, t. 8.

PLATYNOPTERA, Chv., Rev. silb. 2, 1834, n° 18.

1. *Lyciformis*, Chv., loc. cit. 48, Kl. mon., 374.
Brasilia.
2. *Lycoides*, Spin. mon. 2-67, t. 41, f. 2. Kirsch. Berl. ent. zeit., 1865, 93. Nov-Grenata.
3. *Ichnoides*, Chv. (104). * Mexico.

CREGYA, J. Lec. class. col. of the Amer., 1861, 197.

1. *Oculata*, Say Bost. J., 1-163. — Kl. mon., 387. Lec. syn., 32. Massachus.
- Marginipennis, Spin. mon., 1, 363, t. 35, f. 6.
- Marginata, Dej., cat., 3-128.

CHARIESA, Perty, del an. art. 1830, p. 109.

Brachymorphus, Chv., col. Mex., cent., 2, 150.

1. *Vestita*, Chv., loc. cit. — Kl. mon., 363, t. 4, f. 10.
— Spin. mon., 2, 84; t. 45, f. 2. Mexico.
- Spectabilis, Cast., Rev. Silb., 4-50.
2. *Ramicornis*, Perty, loc. cit. 109, t. 22, f. 3. — Spin. mon., 2-86, t. 45, f. 1. Brasilia.

PELONIUM, Spin. mon., 1, 1844, 347.

Lasiodera, Gray.

Philhyra, Cast.

♂ Massue antennaire de 3 articles élaphoceriformes étroitement et longuement développés.

1. *Pilosum*, Forst, nov. sp. ins, p. 49. — Spin. mon., 1, 356, t. 31, f. 5, ♂. Am. sept.
- Marginatum, Say, Il ac. phil., 3, p. 187. — Kl. mon., 360.
- Cinctum, ♀, Spin. mon., 358, t. 36, f. 4.
- Var ♀, femoribus a basi ultra medium, rufis. Texas.
2. *Pensylvanicum*, Chv. (106). Pennsylvania.
3. *Militare*, Chv. (105). * Mexico.

- ♂ Massue antennaire de 3 articles aplanié,
régulièrement développés. Élytres parallèles.
4. *Viridipenne*, Ky. tr. Lin., soc. XII, p. 393. — Kl.
mon. t. 35, f. 3, 362.— Sp. mon., 1-370. Brasilia.
 5. *Trifasciatum*, Cast., Rev. Silb., 4-47. — Kl.
mon., 362. Id.
 - Cleroides, Spin. mon., 1, 374, t. 34, f. 3.
 - 4-Fasciatum, St. Cat., 1843, 83.
Élytres un peu élargies au sommet.
 6. *Stenochiooides*, Chv. (107). Mexico.
 7. *Seminigrum*, Chv., An. fr., 1843, 34. — Lac. En.
atl., t. 46, f. 8. Nov-Grenata,
 8. *Piciventre*, Chv. (108). Cuba.
 9. *Nigroclavatum*, Chv. (109). Yucatan.
 10. *Kirbyi*, Gray, Griff an Kingd. 1-376, t. 48, f. 3. Kl.
mon., 362. Lac., Gén. atl., t. 46, f. 5. Brasilia.
Superbum, Luc., voy. Cast., p. 289.
 11. *Insigne*, Chv. (110). Id.
 12. *Fugax*, Kl. mon., 363. Aragua.
Fulvicorne, Luc., voy. Cast., p. 95, t. 5, f. 2, a. b.
 13. *Scoparium*, Kl. mon., 365. Brasilia.
 14. *Amaenum*, Guer., Ic. Reg. an, p. 55. Spin.,
mon., 1, p. 338, t. 36, f. 3. Id.
Fasciculatum, Kl. mon., 364, t. , f. 12. Spin.
Maculatum, Bld, voy. d'Orby, 94, pl. 6, f. 9. Id.
 15. *Niveum*, Chv., An. Fr., 1843, p. 35. Nov-Grenata.
 16. *Amabile*, Spin. mon., 1, p. 362, t. 33, f. 1. Brasilia.
 17. *Fimbriolatum*, Chev., An. fr., 1843, p. 35. Id.
 18. *Sexnotatum*, Kl. mon., 368. 113. Californ.
Massue antennaire plus ramassée, espèces petites.
 20. *Apicale*, Spin. mon., p. 155, t. 47, f. 1. Brasilia.
 21. *Subfasciatum*, Chv. (113). Guadlupa.
 22. *Bicolor*, Cast., Rev. silb., 4-522, 1836. Nov-Grenata.
Collare, Dej. cat. 3, p.
 - Crinitum, Kl. mon. Spin. mon., t. 33, f. 7.
 23. *Humerale*, Sp. mon., t. 35, f. 3. Brasilia.

24. *Testaceum*, Kl. mon., 367. Spin. mon., 2-154. Id.
25. *Variabile*, Spin. mon., 4-367, t. 36, f. 4. Id.
26. *Bilineicolle*, Chv. (114). Nov-Gren.
Uncinatum, A. Deyr. Cat.
27. *Flavolimbatum*, Sp. mon. 4-354, t. 35, f. 5. Brasilia
28. *Flavomarginatum*, Chv. (115). Id.
29. 4 *Notatum*, Chv. (116). Texas.
30. *Lineatocolle*, Chv. (111). Calif.
31. *Filiolus*, Chv. (112). Id. Mariposa.
32. *Circumcinctum*, Chv. (117). Brasilia.

ORTHOPLEURA, Spin. mon., 2, 1844, p. 80.

1. *Damicornis*, Fab., Ent. sys., supp. 117. — Spin. mon., 2, 80, t. 42, f. 1. Am. sept.
Thoracica, Say, J. ac phil., 3-188.
Var. Quadraticollis, Spin. mon., 2-167, not., t. 32, f. 4.
Bimaculata, Mels., Proc. ac. phil., IV, 307.
Chev., var. Cuba.
2. *Texana*, Bland. Lec., List. col. N.-Amer., 1865, p. 56. Texas.
Var. Punctatissima. Chev., An. Fr., 1843, p. 36.
Cuba.
3. *Lepida*, Kl. mon., 356. Cuba.
4. *Suturalis*, Chv. (118) * Mexico.

ENOPLIUM, Lat. hist. nat., IX, p. 146.

1. *Serraticorne*, Villers, Ent. 1, 1789, p. 222. — Spin. mon., 4-345, t. 33, f. 4. Europ. mer.
Dentatum, Rossi, In. Et., 1790, p. 34, t. 33, f. 2.
2. *Quadripunctatum*, Say, J. ac. phil., 3-188. — Spin. mon., 1, 346, t. 34, f. 5. Amer. sept.

PILUS, New. the Entom., 1842, 364.

1. *Fatuus*, New., loc. cit. 33.—Kl. mon., 389. Tasmania.
Ochropus, Kl. mon., 341, t. 2 f. 10. Spin. mon., t. 28, f. 5.
- Passerini, Spin. mon., 283.

NOTOSTENUS, Spin. mon., 2, 1844, p. 89.

1. *Viridis*, Thg. Nov. ins. Sp., 1, p. 9. Spin. mon., 2, p. 91, t. 42, f. 3. Cap. B. Sp.
- Rufipes, Web., Obs. ent., p. 46.
2. *Cœruleus*, Thg., loc. cit. p. 10. Id.
- Thumbergi, Kl. mon., 354.

LARICOBIA, Rosenh. Zw. neue Kaf., 1846, 5.

1. *Erichsoni*, Rosenh., loc. cit. p. 7, c fig., t. 50, f. 250. J. Duv., Gen. col. Eur., III. Tirolis.
2. Nov. sp. Nice.

LEBASIELLA, Spin. mon., 2, 1844, 77.

1. *Pallipes*, Kl. mon., 353. Mexico.
2. *Erythroderes*, Sp. mon., 2, 79, t. 43, f. 1. Nov-Grenata.
3. *Marginella*, Chv., An. Fr. 1843, p. 42. Lec. syn. 34. California.

CORYNETES, Herbst. Kael., IV, 1791, p. 148.

1. *Cœruleus*, Deg. mon., V, 163, t. 5, f. 13, 14. Kl. mon., 343. Europa.
- Geoffroyanus, Laich. verz. tir. ins., 1-247.
- Violaceus, Schr., Enum. ins., p. 20. — Spin. mon., 2-97, t. 55, f. 4.
2. *Ruficornis*, St., In. XI, p. 42, t. 9, 32, f. 1. — Kl. mon., 347. Europa.
- Violaceus, Harrer, Beschr., Ins, schaff. 2-66. Germania.
3. *Fimetarius*, Woll., An. nat., 17, 1863, 440. Canariæ.
4. *Ovatus*, Spin. in Gay, Hist. Chili, IV, 411, t. 9, f. 11. Chili.

NECROBIA, Lat. Prec. car. Gen. Ins., 1796, p. 35.

Agonolia, Muls.

1. *Ruficollis*, F. syst., Ent., 57. — Spin. mon., 2, p. 103, t. 43, f. 6. Orb. terr.

2. *Rufipes*, Degeer, Mém., V, 165, t. 15, f. 4. — Spin.
mon., 2, 101, t. 42, f. 6. Orb. terr.
Dermestoides, Pill. et Mitterp., It. Poseg., p. 68, t. 7,
f. 6. Africa.
Australis, M. Lay, Dej. cat., 3. 128. Nov.-Holl.
Amethystina, Steph., Ill. Brit., V, 407. Anglia.
3. *Violacea*, Lin., Sys. nat., éd. 10, p. 356. — Spin.
mon., 2-105, t. 44, f. 1. Europa.
Chalybea, St. fn., XI, p. 43, t. 232, f. A. O. Suenia.
Quadra, Marsh., Ent. Brit., 323. Anglia.
Errans, Mels. Proc. arc. Phil., 2-307, Amer. sept.
4. *Defunctorum*, Watl. Reis en Span., 2-63. — Spin. mon.,
2, 108, t. 44, f. 3. Hispania.
Carbonaria, Dej. cat., 3, 128. Algeria.
5. *Bicolor*, Cast., Rev. Silb., IV, 52. — Spin. mon., 2, p.
109, t. 44, f. 4. Hisp.
Thoracica, Dej., cat., 3, 128.
6. *Pinguis*, White, cat. Brit. mus., 4, p. 63. Tasmania.
West., Proc. Zool. Soc., 1852, p. 32, t. 27, f. 10.

OPETIOPALPUS, Sp. mon., 2, 1844, 110.

Opetiopselaphus, Cat. Gem. Har., p. 1759.

1. *Scutellaris*, Panz., Fn. Germ., 38-49. Spin. mon.,
2-112, t. 45, f. 1. Tyrolia.
Bicolor, Man., Dej., cat., 3, p. 127.
2. *Collaris*, Bilbg., in Schr. syn. Ins., 1, 2, 51, not.
Spin. mon., 2, 114, t. 45, f. 6. Cap. B. Sp.

DESCRIPTIONS ET OBSERVATIONS

(1) **CYLIDRUS PALLIPES**. *C. Cyaneo* valde affinis, sed anten-
nis gracilibus, longis; alatus, cyaneus, elongatus, anten-
nis nigris, pectore abdomine pedibusque lâete flavis; ca-
pite elongato, minute punctato, antice recte truncato, linea
longitudinale glabra antice ampliata; mandibulis obliquis,
acutis, decussatis, nigris; palpis ferrugineis; antennis
ferrugineis, clava articulis septem nigris; oculis minutis,
rotundatis, nigris; prothorace cylindrico longo, antice pro-

funde transversimque posticeque in basi angustius sulcato, lateribus posticis paululum attenuato, pilis longis, albis limbato, vage punctato; scutello rotundato, transverso, nigro-opaco; elytris late cyaneis, singulatim rotundatis, politis, fere glabris, attamen perspicue punctatis; capite et prothorace infra cyaneis.

Long^o II, Lat^o 4 mill. — *Cylidrus pallipes* Chv. Cat. Brit. Mus. IV, p. 1. indesc. Cat. Gemm. Harold. t. VI. 1869, p. 1722, sine desc. — Ind. or.

(2) *MACROTELUS?* *CINCTIPENNIS*. Elongatus, niger, capite, prothorace, femoribus (genua quarta antica), elytrisque in sutura et in margine flavis; confertim punctato striatis, oculis et antennis elongatis nigris; capite rotundato convexo, sulco tenue; inter oculos, prothorace vix longior quam latior, antice semi-cylindrico, postice recte truncato lateribus modice rotundato, longitudine convexo, trifossulato; scutello punctiforme fusco; elytris elongatis, parallelis, singulatim rotundatis, tibiis tarsisque nigro-fuscis.

Antennae undecim articulatae, 1^o articulo elongato, clavato, 2^o breve, 3^o longitudinis primi, 4^o paululum minore, 5^o conico, 6-10 brevibus subnodosis, coarctatis ultimo longo cylindrico spongioso.

Longo 8 Lat^o 3 mill. — Ins. Cuba, mus. D. Gundlach.

(3) *CLADISCUS HINDOSTANUS*. Elongatus, angustus, punctatus; pilis erectis cinereis vestitus, antennis aequaliter pectinatis, niger, elytris punctato-striatis, fascia ultra medium, angusta, recta, albida, tibiis tarsisque pallidis.

Long^o 6, Lat^o 2 mill. — Ind. or. Sylhet. Mus. Chevrolat.

(4) *TILLUS LEUCOMELAS*. Elongatus, convexus dense hispidus, nigro-cyaneus, prothorace in margine laterale, scutello, elytris in margine, sutura usque ad fasciam ultra medium sita (maculis elongatis tribus contiguis formata, marginali bifida) albis; capite rotundato, villoso, nitido, minute punctato, recte truncato, foveis duabus inter oculos impressis; mandibulis arcuatis, antennisque nigris, tribus ultimis articulis latis (clava 5 art.); oculis fuscis, prothorace subcylindrico, antice latiore posticeque truncato, in basi transversim sulcato, minute punctulato; scutello rotundato; elytris in apice paululum latioribus, fere parallelis, in humero callosis, intus minute depresso, in medio suturæ apertis et in ipsa sutura sulcatis; corpore infra

pedibusque cœruleis, breviter albo pubescentibus, linea laterali alba in lateribus pectoris.

Long° 10 Lat° 4 mill. — Mexico. Mus. Chevrolat.

(5) *PALLENIS FULVESCENS* (Mots.). Elongatus, pallide rubro testaceus, dense pubescens, capite et prothorace nitidis, oculis globosis pedibusque nigris, tarsis, coxisque rufis; capite minutissime punctato, lato, vertice convexo, antice plano, palpis antennisque pallidis; prothorace antice si-nuose-basique recte constricto, lateribus anticis amplia-tim rotundato, minute punctato, linea longitudinale; scutello parvo punctiforme; elytris sub parallelis, singulatim rotundatis, obsolite punctulato-striatis.

Long° 7 2/3 Lat° 2 2/3 mill. — India or.

J'ai reçu cette espèce de feu Motschulsky; j'ignore s'il l'a décrite sous ce nom, je ne la trouve citée nulle part; elle se trouvait rapportée au genre *Callitheres* de Latreille.

(6) *CYMATODERA MELAZONA*. Elongata, albo-pubescentis, fusco lurida, nitida, elytrorum fascia transversa nigra, post medium posita, in sutura obliqua, antice transversim flavo limbata; capite convexo, minute denseque punctato, recte truncato, labio transversim quadrato, flavo; palpis anten-nisque pallidis; oculis fuscis; prothorace longo, antice cylindrice atque postice truncato, transversim bisulcato, lateribus mediis profunde constricto; scutello rotundato, concavo; elytris ad apicem latioribus, singulatim rotun-datis, longitudine convexis, striis aliquot a basi ad me-dium punctatis; corpore infra pedibusque fusco-luridis nitidis, minute denseque punctulatis.

Long° 10 Lat° 3 mill. — Nova Grenata Mus. J. Thomson,
Chevrolat.

(7) *CYMATODERA GENICULATA*. Elongata, fusca, prothorace longo, ante basin constricto, antice lateribus subangulato, transversim strigato; elytris subparallelis, apice paululum ampliatis, singulatim rotundatis, nigris, fascia basale an-gusta fusca; fascia media lata antice posticeque angulata; maculaque ante apicem flavis, punctato-striatis; ore, palpis pedibusque flavis, genua nigra¹.

1. Le genre *Dupontiella* de Spinola, composé de deux espè-

Long^o 7 1/2, lat^o 3 1/4 mill. — Guatemala mus. Sallé.

(8) PRIOCERA HYPOCRITA. *P. Spinolæ affinis*, sed minor, notulisque elytrorum sex luteis angustis, limboque apicale luteo et rotundato; elongata linearis, picea albido-pubes-cess; capite breve, rotundato, antice semiarcuato, trans-versim sulcato inter oculos fovea punctiforme; mandibulis brevibus, arcuatis piccis nitidis, labro transverso, luteo, antennis longis obscuro-ferrugineis; oculis magnis globosis fuscis; prothorace elongato, postice attenuato, in basi profunde sulcato, sulcis duobus anticis tenuibus disco conjunctis; scutello punctiforme transverso; elytris parallelis, singulatim rotundatis, fusco piceis, maculis, tribus parvis læte flavis, una in medio basis rotundata, secunda obliqua margine adnexa, angusta, tertia versus suturam posita, sexta apicale lutea, supra recte truncata; corpore infra piceo; fascia lata abdominale antica flava, femoribus, basi luteis.

Long^o 7, lat^o 2 1/2 mill. — Brasilia.

(9) PRIOCERA FLAVOGUTTATA (Pilate). Elongata paral-lela, dense albo pilosa, fusco-nitida, elytris punctato-striatis guttis sex flavis; quatuor anticis æqualibus par-vis, apicalibus magnis; ore, palpis antennisque pallidis.

Long. 5 lat. 2 mil. — Yucatan, L. Pilate ex Museo auctoris.

(10) AXINA RETROCINCTA. *T. chinensi affinis*, elongata fusca nitida pallide pilosa, elytris luteolis, sub seriatim punctatis, fascia subapicale fusca medio ampliata; pedibus longe pilosis, femoribus in dimidia parte postica nigris; capite crebre punctulato postice convexo, antice planiusculo, subarcuatim emarginato, sulco antico arcuato, in fronte foveato; labio rufo; trans-versim quadrato; antennis palpisque pallide testaceis; oculis reticulatis, nigris; prothorace crebre punctato, ante posticeque recto, lateribus anticis rotundato, in ipsa basi, post marginem anticum, stricte-medioque longitu-dinis, sulcato; scutello punctiforme fusco; elytris testaceis subseriatim grosse punctatis, apice glabris, fascia

ces de la Nouvelle Grenade, les *Fasciatella* et *Ichneumonides* de cet auteur, n'appartient pas aux Clérides, mais plutôt aux Tro-gositaires.

postica medio ampliata fusca, punctulo in imo, sutura fusca; corpore infra piceo, pectore dilutiore, ano pallido.

Long^o. 11 lat^o. 3 mill. -- Africa Australi Natal ex Museo auctoris.

THANASIMUS MARMORATUS. Chv. Rev. zool. 1842, p. 277. Cap. Bon. Sp. Cette espèce est la même que le *T. Marmoratus*, Kl., le *T. Capensis* Spinola et est synonyme du *T. Chinensis*, Fab. Ent. sy. app. 444.

Cette espèce doit faire partie du genre AXINA.

(11) **OPILO NIGRITES.** Elongatus, niger, nitidus, crebre et minute punctatus, albo pubescens, in medio elytrorum fascia transversa flava; capite postice convexo, antice plano, recte truncato, in margine anguste flavo, vase villoso; mandibulis, antennis oculisque nigris; palpis nigris, art. ultimo securiforme intruncatura luteo; prothorace elongato, convexo, extremitatibus truncato, antice angulose postice ad basin recte constricto, lateribus anticis rotundato, foveaque punctiforme impresso; scutello parvo, transverso, rotundato declive; elytris parallelis, convexis, in humero subrectangule elevato-obtusis, conjunctim rotundatis, crebre punctulatis, in apice albo villosis; abdomine rubido; corpore infra pedibusque longe pilosis, nigris.

Longo 9, Lat^o 3 mill. — Africa. Mus. Mniszech et Chevrolat.

Cette espèce devra se placer près de l'*O. tristis* Kl. *funebris*, Spin., qui a pour patrie Madagascar.

(12) **OPILO?TUBERCULICOLLIS.** Elongatus, flavus, albido pilosus, elytris maculis quatuor, duabus transversis medio, duabus apicalibus rotundatis, abdomineque nigris; capite minutissime punctato, in fronte convexo, antice arcuato, marginato, sulco antico, lateribus impresso, altero sulco frontale semicirculare triimpresso; labio lato, transverso, emarginato, mandibulis brevibus arcuatis, oculisque rotundatis, nigris; antennis flavis; prothorace antice posticeque recto, lateribus mediis rotunde ampliato, basi constricto, transversim sulcato, tuberculis septem dorsalibus, linea longitudinali angusta; scutello minuto, rotundato; elytris parallelis, singulatim rotundatis, obsolete punctato

(A. Chevrolat.)

3

striatis; pedibus longis, villosis femoribus longe clavatis; abdomine nigro basi et apice flavo.

Long^e 6, Lat^e 2 mill. — Africa Australi, Natal, ex mus. auct.

(13) *OILO VARIIPES*. Elongatus albo-pubescent nigro piceus, antennis, palpis, in elytris ultra medium fascia lata, maculaque apicale, pedibus basi (femoribus tibiis et tarsis rufis) abdomineque flavis; capite lato, rotundato, in vertice convexo, glabro minute punctato; antennis longis gracilibus, clava triarticulata, oculis globosis rotundatis, pallidis; prothorace elongato, glabro, basi attenuato, truncato, constricto, sulco longitudinale profundo in dimidio antico; scutello rotundato, punctato, concavo; elytris parallelis, planiusculis, striis usque ad fasciam clathrato-punctatis, in fascia simpliciter punctatis, ultra anguste sulcatis; pectore rubescente, minutissime et rugose punctato; pedibus longe villosis.

Long^e 11, lat^e 4 mill. — Sydney. Mus. auctoris.

Cette espèce est voisine de l'*O. congruus* New; elle est plus petite. les deux bandes des élytres sont pâles, larges, les stries sont plus régulièrement ponctuées, et l'espace qui existe entre ces bandes est nettement sillonné; dans l'espèce comparative, les stries ponctuées, ces points diminuent de grosseur, les interstices sont finement pointillés, de plus, chez la nouvelle espèce, les genoux sont d'un blond roux plus étendu, et non pas châtaignes.

L'*Opilo mœrens* (West. clert. White, cat. Br. Mus., IV, p. 57, West., Proced. zool. Soc., 1852, p. 50, 126-261, 10, d'Adélaïde, est un Scrobiger.

(14) *OILO PRÆUSTUS*, Elongatus tenue albo-pubescent, niger nitidus, antennis, elytris (a basi ad medium punctato-striatis, apice glabris piceo terminatis), pedibus pectore abdomineque flavis; capite elongato, postice convexo, antice verticale, crebre et ruge punctato, transversim rugato; mandibulis arcuatis nigris, palpis ferrugineis: articulis 2 apicalibus infuscatis; antennis gracilibus rufis; prothorace elongato, convexo, lateribus mediis rotundato, antice cylindrice - postice recte - truncato, lateribus anticis sortiter basique profunde constricto. nigro,

minute punctato, medio breviter lateque canaliculato; scutello rotundato, plano, punctato, fusco; elytris pallidis subparallelis, in apice paululum latioribus, convexis, apice glabris, quarta parte postica, recte piceo-terminata; pectore, abdomine, pedibus punctatis, flavo pallidis.

Long° 10, lat° 3 mill. — Africa Australi, lac N'Gami, mus. J. Thomson, Chevrolat.

(15) *OPILO PUNCTIPENNIS* (Fairm.). Elongatus, fulvo-pilosus, piceus, elytris pallidis, vase et minute fusco-punctatis. macula dorsali picea, ante apicem interrupta, pectore dilute piceo, abdomine nitido, lucido, lateribus apiceque infuscato, crebre punctato; pedibus pallidis, genua picea; Capite rotundato, crebre punctato, inter oculos, foveis duabus elongatis, ore, palpis antennisque ferrugineis, clava articulis tribus rotundatis, prothorace elongato, sulcis duobus transversalibus obliquis, medioque breviter sulcato ♀.

Long° 8, lat° 3 2/3 mill. — Chili.

SALLEA. Nouveau genre.

Corps court large, ailé, couvert en dessus d'un duvet court, blanc. *Palpes* à dernier article fortement en hache. *Mandibules* arquées moyennes. *Lèvre* transverse, échancree. *Tête* arrondie sur le vertex, échancree en demi-cercle. *Antennes* courtes, de onze articles : 1^{er} assez grand, courbé, presque cylindrique : 2-3 allongés, presqu'égaux, 3^e plus mince; 4-7 subarrondis, petits, poilus, massue de quatre articles assez gros, dernier turbiné. *Prothorax* aussi long que large, droit et à demi-cylindrique en avant, coupé rectangulairement en arrière, arrondi régulièrement de chaque côté, légèrement convexe en dessus, fortement étranglé près du bord antérieur et en ligne droite sur la base. *Écu*sson subarrondi, relevé sur ses bords. *Élytres* courtes, larges, deux fois aussi longues que le prothorax, arrondies chacunes à l'extrémité, déhiscentes sur la suture. *Abdomen* de cinq segments, premier large. *Pattes* rapprochées, courtes, cuisses modérément renflées, sub-cylindriques, antérieures plus courtes, aplatis en avant.

Hanches antérieures contiguës, arrondies en devant.

Ce genre à la forme d'une grande *Nécrobie*.

Je dédie ce nouveau genre à M. Auguste Sallé; les nombreuses découvertes qu'on lui doit dans les diverses branches de l'histoire naturelle, en Mammifères, en ornithologie, entomologie en général, erpétologie, conchyliologie et plantes pendant le long séjour qu'il a fait à la Nouvelle-Orléans, au Mexique, à Venezuela, à Saint-Domingue, etc., etc., lui méritent bien ce faible témoignage de notre vieille amitié.

La seule espèce, jusqu'à ce jour publiée, est le *Serriger Coffini* White; elle n'appartient pas à ce dernier genre. J'adopte provisoirement la place qu'il lui a été assignée au catalogue Gemm. Har. Je crois qu'elle devra avoisiner le genre *Chariessa*, dont elle a la forme raccourcie.

(16) **SALLEA NECROBIOIDES**, modice elongatus, latus, pilis erectis nigris sat dense tectus, læte cyaneus, capite viride regulariter punctato, mandibulis nigris, palpis, labro, clypeo antennis pedibus et abdomine rubris; capite convexo, foveis duabus inter antennas; antennis brevibus, clava 4 articulata, art. ultimo magno turbinato; prolohrace lateribus rotundato, vage piloso, antice posticeque, recto transversim biconstricto; scutello plano, declive punctato, antice truncato, postice rotundato; elytris antice recte truncatis, elevatis, convexis, singulatim rotundatis, minutissime et densissime punctulatis, rugulosis, pilis rasis albidis, dense tectis, sutura vix sulcata.

Long. 7, 12; lat. 4, 5 2/3 mill. — Guatemala, a D. Sallé. donatus.

(17) **SALLEA RUBRIPENNIS**, elongatus, latiusculus, nigro alboque pilosus, cœruleus, mandibulis, palpis, antennis et oculis nigris; elytris rubris tenue denseque punctulatis, singulo obliteratis tribus striis angustis, singulatim rotundatis, sutura sulcata et marginata ♀.

Long. 11, lat. 5 1/3 mill. — Mexico mus. Sallé.

(18) **SALLEA BICOLOR**, elongatus, latiusculus, tenue albo pubescens granulatus, supra rubidus, pectore abdomine

pedibusque nigris, coxis, femoribus quatuor anticis ferrugineis ; capite convexo, inter oculos transversim sulcato, foveis duabus brevibus elongatis ; mandibulis rufis in apice nigris ; palpis rufis ; antennis nigris, 4^o art. rufa, clava tomentosa et triarticulata, ultimo articulo apice breviter acuto ; oculis nigro fuscis ; prothorace antice posticeque transversim constricto, lateribus rotundato, nitido ; scutello parvo, triangulare ; elytris singulatim rotundatis, in sutura marginatis apiceque unisulcatis ♀.

Long. 6 2/3 ; lat. 2 1/3 mill. — Mexico, Vera-Cruz. mus. Sallé.

C'est avec doute que je place cette espèce dans ce genre.

OPILO. MM. le docteur Gemminger et Harold, Catalogue des Coléoptères, tome VI, p. 1729, ont réuni, comme synonymes d'une seule, les trois espèces suivantes, de mœurs différentes.

L'*O. Mollis*, vit dans la campagne, sous les écorces des arbres, du noyer particulièrement, ou bien dans le bois même, et se nourrit de larves de Coléoptères. Indépendamment de la différence des dessins, les stries des élytres sont irrégulièrement indiquées, les points qu'elles renferment sont petits et peu profonds.

L'*O. Domesticus* se rencontre dans nos habitations et se nourrit probablement de larves d'*Anobium* ; les dessins des élytres sont plus corrects, les stries plus profondes et les points internes réguliers et bien marqués.

L'*O. Pallidus* vit sur les Conifères. On le prend quelquefois au bois de Boulogne, et il est partout assez rare. Sa forme courte et élargie le distingue des deux précédentes espèces, indépendamment de sa couleur générale testacée.

L'insecte que j'ai décrit sous le nom de *Opilus Germanus* n'est pas une var. de l'*O. domesticus*, mais de l'*O. pallidus*, par la disposition des stries de l'élytre. Je possède une autre var. très-remarquable de Kabylie, qui a la tête, le prothorax (moins la bordure antérieure qui est pâle),

une bande postérieure aux élytres et les genoux couleur de poix, le reste du corps est testacé, et les stries sont régulièrement ponctuées; cette variété se rapporte aussi au *Pallidus*.

(19) **DERESTENUS DISTINCTUS** (Pilate). *D. 4 lineato similis*, sed in elytris tantum lineis duabus pallidis differt, elongatus, elytris, pectore, genua, tibiis tarsisque nigro fuscis opacis, capite lato, convexo, nitido, vix distincte punctulato, pilis tenuibus fuscis tecto, flavo, inter oculos ad verticem et post oculos, nigro; mandibulis apice nigris, palpis flavis ultimo art. nigro, antennis nigris, breviter pilosis, prothorace elongato, transversim biconvexo et biconstricto, pallide flavo, linea longitudinale nigra postice ampliata, scutetto declive postice rotundato; elytris granulosis fuscis, linea lata flavo pallida, secundum suturam posita, ante apicem abbreviata, pilis flavidis simbriatis, lineola humerali obsoleta; prothorace infra, femoribus et abdomine pallido flavis.

Long^o 9, lat^o 3 mill. — Yucatan, A. D. L. Pilate accepi.

(20) **DERESTENUS NIGRIFRONS**, modice elongatus, latus, pilis erectis tenuibus griseis tectus; capite antice depresso flavo postice transversim convexo nitido nigro, minutissime punctato, piloso, palpis mandibulis antennis et oculis nigris; prothorace rubido, fortiter transversim bisulcato, macula rotundata in medio antico, basique nigris, scutello parvo, rotundato, nigro; elytris obscurō-cæruleis, parallelis, singulatim rotundatis, convexiusculis, granulosis, distincte punctatis, obsolete costatis; pectore femoribusque flavis, genua, tibiis tarsis et abdomine (nitido) nigris.

Long^o 5 1/2, lat^o 2 1/4 mill. — Mexico, Oaxaca, Mus. Sallé, Chevrolat.

(21) **DERESTENUS LATERALIS**, elongatus, breviter nigro pilosus, niger, capite prothoraceque nitidis, vitta laterale lata rubra in prothorace et in elytris; ore coxisque flavis. ♀.

Long^o 7 1/2, lat^o 3 mill. — Mexico. Mus. Sallé.

(22) **DERESTENUS MUTABILIS**, elongatus, albo-pubescent, glaber, flavidus, nitidus, in prothorace macula rotundata nigra margine antico posita; elytris valde rugosis, nigris,

lineis duabus flavis, ante apicem abbreviatis; abdomine nigro nitido ♂.

Long^o 7, lat^o 2 mill.

Var. A, niger; prothorace flavo nitido, linea longitudinali nigra nitida, antice attenuata; elytris minutissime coriaceis, nigris opacis, in sutura usque ad medium anguste, a basi ultra medium postice angulose flavis, linea marginale lineaque secundum suturam postice bifida nigris; corpore infra nitido nigro; coxis flavis ♀.

Long^o 6 1/2, lat^o 2 mill.

Var. B, niger; prothorace flavo, linea dorsale nigra nitida, postice rotundata; elytris pallide flavis, minutissime granulatis, linea marginale, alteraque in singulo secundum suturam posita (antice bene signata dein oblitterata) nigris, ante apicem abbreviatis, corpore infra nigro; coxis flavis ♀.

Long^o 7, lat^o 3 1/5 mill. — Mexico. Mus. Sallé.

Var. C. niger, prothorace rufo, linea longitudinale lata nigra; elytris rufis, macula scutellare, postice bifida, maculaque apicale, nigris, pedibus basi coxisque rufis.

Long^o. 7, lat^o 2 mill.

(23). DERESTENUS VITTIPENNIS, elongatus. breviter atque dense griseo villosus et flavus; oculis fuscis, in margine prothoracis puncto rotundato nigro, elytris nigris, vittis duabus latis albis, ante apicem interruptis; abdomine nigro nitido, instrumento copulari rubro, genua fusca, tibiis longitudine unisulcatis ♂.

Long^o 7, lat^o 2 mill. — Mexico. Mus. Sallé.

(24) THANASIMUS MELANOCEPHALUS. T. dubio vicinus, minor, capite nigro, elytris convexis, singulatim intra humerum bistratiis præcipue differt; elongatus, breviter nigro pilosus, minute denseque punctatus, ruber nitidus, capite antice plano, pubescente, inter oculos tuberculo elongato, utrinque depresso; mandibulis rufis, apice nigris; palpis antennisque rubris; oculis fuscis; prothorace antice posticeque constricto, lateribus modice rotundato, linea longitudinale angusta, antice angulose depressa, postice abbreviata; scutello declive, plano, rotundato, marginato;

elytris basi rubris ante medium ad apicem nigris, rotundatim paululum ampliatis, fasciis duabus flexuosis albis; 1^o media antice angulosa, 2^o ante apicem in sutura cordiforme; corpore pedibusque rubris nitidis, minute punctatis, parce sat longe albo villosis.

Long^o 6, lat^o 2 mill. — Nova Scotia, British Mus.

Cette espèce ressemble au *T. rufipes*, est plus petite, plus étroite, d'un rouge vif et les deux bandes flexueuses des élytres l'en distinguent de suite.

(25) *CLERUS OBLIQUEVITTIS*, *C. mystico* Kl. affinis, elongatus, holosericeus, niger, elytris basi albidis, oblique transversim nigro-bifasciatis, apice luteo-fuscis; capite convexo, nigro, antice plano, depresso, cinereo, inter oculos tuberculo parvo; mandibulis, palpis, antennis (1^o art^o flavo) oculisque nigris; prothorace valde convexo, nigro, pilis nigris hirto, extremitatibus truncato, basi sulcato; scutello elongato, subquadrato, in utroque latere unituberculato, macula angulata nigra postice ad suturam ducta; elytris usque ultra medium albis, fascia ab humeris ad suturam oblique descendente abbreviata, fasciaque infra extus recte flexuosa nigris apice late luteo-fuscis, abdomine nigro; pectore pedibusque cinereis, longe pilosis.

Long^o 7 1/2, lat^o 3. mill. — Brasilia, a D. Sommerso missus.

Cette espèce est voisine du *Cl. artifex*, Sp. mon 1, 243, t. XXII, f. 3, qui a pour patrie la Guyane française.

(26). *CLERUS MUTABILIS*, elongatus griseo pilosus, rufus, prothorace in margine antico pallido rufo, fascia media absolute nigra, elytris in dimidio antico rufis basi quadridorsatis, fascia media flava secundum suturam attenuata, ad fasciam nigram et rectam adnexa, quarta parte apicale pallida, in medio striga transversale obsolete nigra. Antennis fuscis, duobus primis articulis ferrugineis, oculis obscuris; corpore infra rufo, abdomine nigro ad basin et ad apicem pallido; pedibus rufis, basi flavis, femoribus medio nigro annulatis ♂.

Var. A. Rufus, capite in dimidio postico nigro, prothorace toto rufo, femoribus in dimidio postico nigris ♀.

Var. B. Nigricans, capite rufo, in longitudine nigro,

prothorace nigro, margine antico rufo pallido, elytris nigricantibus basi nodulis quatuor brevibus, fasciola arquata cinerea, externe abbreviata, fascia media flava, fascia holosericea nigra ante apicem, maculis duabus rotundatis ante apicem et maculis duabus parvis in apice flavis; corpore infra nigro, primo segmento abdominis anguste-pedibusque rufis, genua obscura ♀.

Long^o 6, 7, lat^o 1 2/3 2 1/3 mill. — Mexico.

(27) CLERUS SEMIOCHRACEUS, elongatus, tomentosus, albo nigroque pilosus, capite et prothorace fortiter ochraceis, elytris quinque fascis (fascia 1^a basale angusta fasciaque apicale fusco-cinereis; fascia secunda, tuberculis quatuor transversim dispositis efficiente, et fascia quarta nigris, quinta media flava, his fasciis rectis, capite antice albo piloso, antennis basi rufis, postice fuscis; prothorace ante medium tenue transversim (fascia obsoleta nigra) constricto; pectore pedibus quatuor anticis griseis, abdomine pedibusque posticis, nigris.

Long^o 7 1/2, lat^o 3 mill. — Mexico, Mus. Sallé, Chevrolat.

Cette espèce est très-voisine de l'*Assimilis* (il est plus petit), celui-ci a au milieu du corselet une bande noire nettement marquée, le quart basal des élytres est roux, avec un seul tubercule à la base de chaque étui, la bande du milieu et celle apicale sont pâles, plus large. Dans la nouvelle espèce, la base est d'un brun foncé, avec deux tubercules sur chaque côté, les deux bandes mediane et apicale sont jaunes, le bord supérieur de la première est marginé de noir et la bande noire est étroite et nettement transverse.

(28) CLERUS INDAGATOR, elongatus, rufus, in prothorace fascia antica, in elytris fasciis quatuor nigris (1^a humurale, 2^a infra obliquis, 3^a ultra medium lata, 4^a parva abbreviata ante apicem), fascia rubra inter duabus fascias prima nigras, medio apiceque albis; capite crebre punctato, rufo; mandibulis oculisque nigris; palpis, antennis, corpore infra pedibusque (crebre punctatis villosis) rufis; prothorace rufo, basi profunde sulcato; scutello rotun-

dato, punctato; elytris prope suturam in fascia prima nigra gibbam referens, sutura marginata rufa.

Long^o 6 1/4, lat^o 1 2/3 mill. — Venezuela. Mus. Sallé, Chevrolat.

(29) CLERUS PARAENSIS, elongatus, breviter tomentosus niger, elytris basi rufis (gibbis duabus basalibus acutis) postice nigris, parte nigra albo-trifasciata, corpore infra rufo, ano nigro, pedibus nigris basi pallidis; capite nigro vidente, minutissime punctulato albo-villosulo, apice transversim convexo, antice depresso, palpis mandibulisque nigris nitidis, antennis gracilibus clava triarticulata; prothorace postice coarctato, attenuato, nigro, holosericeo, antice posticeque fortiter marginato, antice albo postice rufo; scutello punctiforme rufo; elytris fascia prima medio sita, paululum arcuata, ante suturam attenuata, secunda suturæ ad marginem obliqua ante apicem, tertia apicale transversa, tribus segmentis abdominalibus posticis nigris.

Long^o 8, lat^o 3 mill. — Para. Mus. auct.

(30) CLERUS MERIDANUS (Pilate), *Ct. miniato* Bl. vere similis, nigro hirtus tomentosus, prothorace in margine antico atque postico fascia grisea villosa; elytris in dimidia parte basali rubris, fasciis duabus rotundatis nigris ultra medium positis sed antice flavo marginatis, in quarta parte apicali griseis; pectore rubido, pedibus nigris, griseo indutis, longe villosis, abdomine nigro.

Long^o 9, lat^o 3 mill. — Yucatan, Merida. Mus. Chevrolat.

Cette espèce diffère du *Ct. miniatus*, Bld., qui a les antennes et les pattes rouges (ces organes sont noirs dans la nouvelle espèce), de plus l'extrémité apicale grise des élytres offre au centre une tache irrégulière noire qui fait tout à fait défaut dans la nôtre.

(31). CLERUS QUADRINODOSUS, elongatus, tomentosus, rufus, pilis brevibus albis et nigris parce hirsutus, capite obscuro, griseo pruinoso, dense coriaceo, ore, palpis, antennis, prothorace (faseia dilute cinerea antica) elytris basi anguloseque in apice, pectore, femoribus et tarsis rufis; elytris ante apicem fascia lata nigra, suturæ non adnexa, supra et infra fasciis duabus albo-marginalata, tibiis obscuris, abdomine nigro.

Long^o 6, lat^o 3 mill. — Mexico, Mus. Sallé, Chevrolat.

(32) CLERUS TORQUATUS, elongatus, niger, elytris (agnosis, pone scutellum modice gibbosis) basi rufis, postice nigris, parte nigra albo trifasciata, corpore infra et tarsis rubris pedibus basi pallidis; capite vidente, minutissime punctulato, palpis antennisque ferrugineis, mandibulis nigris; prothorace postice attenuato, fortiter biconstricto, margine antico rotundato albo, fascia media holosericea nigra alterea fascia supra basim cinereo rubra, margine postico rufo; scutello punctiforme rufo; fascia media elytrorum alba, in margine ampliata oblique arcuata, secunda ante apicale suturæ adnexa, fere trigona tertia apicale minuta.

Long^o 8, lat^o 3 1/4 mill. — Guyana, Maroni.

(33) CLERUS FABER. *Cl. ruficollis* affinis, elongatus, niger dense griseo tomentosus, elytris macula apicale fasciis que tribus pallide flavis, 1^a intra humerum, 2^a parallela infra, ambo secundum suturam inter se oblique junctis, 3^o media, recta antice arcuata; capite plano, griseo pruinoso antice semi-circuiter emarginato, vertice nitidulo punctulato, foveola centrali modice impressa; antennis nigris, 1^a articulo rufo, externe nigro lineato, apicale turbinato acuto; prothorace antice recte fortiterque constricto, fascia cinereo villosa, in basi profunde sulcato; elytris minutissime punctulatis et coriaceis, obsolete costulatis; corpore infra atque pedibus dense cinereo villosis.

Long^o 9, Lat^o 3 1/2 mill. — Para. Mus. Chevrolat.

(34) CLERUS SIMULANS, *Cl. miniato*, Sp. similis, elongatus niger, nitidus, elytris pallide flavis, medio miniatis, fasciis quatuor obliquis nigris; capite lato, convexo nitido, minutissime punctato, truncato, antice setulis brevibus albidis, inter oculos nodulo elongato, foveolis duabus obsolete signato; antennis fuscis, 1^o articulo rubido; oculis oblongis nigris, postice albo longe villosis; prothorace globuloso nitido, minutissime punctato, basi antice que fortiter constricto; scutello rotundato concavo; elytris parallelis convexis, apice anguste rotundatis, in humero modice callosis, 1^a fascia humerale obliqua ante suturam abbreviata, 2^a arcuata integra, 3^a ad quartam apicalem faciam suturæ et marginæ juncta; corpore pedibusque nigris dense punctatis brevissime albo villosis.

Long^o 12, Lat^o 2 1/2 mill. — Cayennea D. Mniszechio donatus.

(35) **CLERUS SANGUINIPES**, *C. consanguineo* affinis, elongatus niger nitidus, crebre, minute reticulatim punctulatus, labio, palpis, antennis pedibusque sanguineis; in elytris macula basali oblonga, fasciisque duabus abbreviatis, 1^a ex humero ad suturam obliqua, ante et 2^a post medium, etiam obliqua, sed inversa modo, pilis vagis erectis nigris tectis; capite convexo, nitido, minute atque regulariter punctato, foveis duabus anticis rotundatis; prothorace basi attenuato, antice transversim constricto ibique griseo villoso; elytris in humero rectangularis, parallelis, sat latis, in sutura unisulcatis in apice paululum griseo pilosis, pedibus griseo longe villosis.

Long^o 7 1/2, lat^o 3 1/3 mill. — Mexico, Mus. Chevrolat.

Cette espèce doit suivre le *C. Phaleratus* de Klug.

(36) **CLERUS TRICINCTUS**. *C. consanguineo*, vicinus, sed minor, angustus pedibus rubro obscuris; niger, nitidus, minute punctatus, pilis erectis nigris et dense fuscis tectus, in elytris puncto humerali suboblongo, fasciisque tribus flavis: 1^a obliqua ex humero versus suturam, 2^a media arcuata, 3^a ante apicem recta tribus in sutura abbreviatis. Capite convexo, minute punctulato, foveis duabus elongatis anticis, medio breviter carinatis, ore antennis pedibusque basi rubro pallidis; prothorace basi attenuato, transversim bi-constricto; elytris antice truncatis, intra humerum depresso, parallelis, in sutura unisulcatis, minutissime et crebre punctulatis; corpore infra nitido, minute punctato, abdomine pilis raris albis tecto.

Long^o 5 1/2, lat^o 1 2/3. — Para. Mus. Jekel, Chevrolat.

Il existe dans ma collection un exemplaire de même provenance, qui ne se distingue que par ses pattes entièrement ferrugineuses. C'est simplement une variété.

(37) **CLERUS PILATEI**, parvus, elongatus, niger tomentosus, capite griseo; prothorace fascia antica griseo villoso; elytris tuberculis duobus elongatis nigris ad basin, pone scutellum sitis, linea elongata supra, antice posita, et annulo postico marginatis flavis; præterea fascia media recta paululum arcuata, suturæ non adnexa, etiam flava, in apice griseo tomentosis; antennis pedibusque subrufis.

Long^o 5, lat^o 2 1/4 mill. — Teapa (Yucatan) a D. L. Pilate donatus.

(38) CLERUS COGNATUS. *C. tricincto*, valde similis, elongatus, angustus, niger nitidus, supra et infra, pilis erectis nigris sat dense tectus, antennis, femoribusque nigro obscuris, tibiis tarssique pallidioribus, elytris tenuissime striatis, seriatim granulatis et intus costulatis, macula basale rotundata, fasciisque duabus flavis, 1^a infra humerum ad suturam oblique ducta, 2^a in medio transversim arcuata, suturæ nec adnexis, in apice recte griseo tomentosis; capite in vertice nitido, antice inæquale obscuro, inter oculos sulcis duobus intus punctatis, labro, mandibulis, antennis atque oculis nigris; prothorace postice valde attenuato, antice rotundato tantumque lateribus, sed in basi profunde sulcato; elytris elongatis, angustis, parallelis, intra humeros profunde impressis; corpore infra pedibusque nigris cinereo villosis, tarsis rufescentibus.

Long^o 5, lat^o 2 mill. — Para. Mus. Chevrolat.

Cette espèce, moins la tache apicale d'un gris tomenteux, ressemble au *C. arcuatus*, Spinola, et aussi au *C. pusillus*, Kl.

(39) CLERUS MOROSUS, elongatus, pilis densis brevibus et aliis erectis griseis tectus, niger holosericeus, undique minute et dense punctatus, elytris macula basali rotundata, fascia infra, obliqua abbreviata fasciaque ultra medium recurva, ad suturam non adnexa flavis, apice cinereis; capite rotundato, antice truncato, inter oculos in fronte arcuatim depresso; mandibulis nigris; palpis rufis; antennis ferrugineis, articulis 2 primis dilutioribus, clava fusca; prothorace lateribus rotundato, postice attenuato, convexo, transversim biconstricto; scutello declive, quadrato; elytris antice subrectangulis, in humero elevatis; pectore cinereo; abdomine nitido, femoribusque (griseo pilosis) nigris, tibiis rufescentibus, tarsis nigris. ♀

Long^o 7, lat^o 3 mill. — Brasilia.

(40) CLERUS SCUTELLARIS, elongatus, attenuatus, dorso valde convexus, glaber, niger, nitidus, nigro pilosus, linea laterali in prothorace lineaque suturale post scutellum abbreviata, albis; capite convexo, minutissime punctato, truncato, inter oculos unituberculato atque bifossulato;

ore, palpis antennisque nigris; prothorace cylindrico, extremitatibus truncato, antice tenue postice transversim sulcato, linea laterali albo pilosa signato; scutello rotundato albo; elytris elongatis, basi truncatis, in humero rotunde subrectangulis, elevatis, intusque modice depresso, in sutura et in margine leviter unisulcatis, ad apicem albo villosis; corpore infra, pedibusque longis, nigro nitidis, nigro alboque villosis, linea laterali alba in lateribus pectoris.

Long° 8, lat° 3 mill. — Mexico. Orizaba. Mus. Chevrolat.

Cette particularité des élytres, comprimées sur le côté, voûtées en dessus, devra probablement par suite former une division ou un genre particulier.

(41) CLERUS IMMARGINATUS, *C. lavigato*, valde similis, minor, brevior postice latior, elytris nigro pilosis (pilis erectis) in margine non albo marginatis præcipue differt; elongatus, omnino niger nitidus, politus nigro pilosus; capite modice convexo, vertice vix punctato, inter antennas semi-circuiter sulcato, tuberculo foveisque duabus contiguis supra signato, punctisque aliquot vagis circumductis; prothorace elongato, basi fortiter anticeque tenue sulcato; vage punctato (punctis transversis); scutello transverso, rotundato; elytris antice obtuse rectangulis, ad apicem latioribus, in margine et in sutura unisulcatis, infra scutellum secundum suturam tuberculo nitido signatis.

Long° 5, lat° 2 1/2 mill. — Nova-Grenata, littaribus flum. Magdalena. Ex. mus. auctoris.

Cette espèce est tellement semblable au *Clerus lavigatus* du Mexique, qu'à la première inspection on la prendrait pour une variété de cette espèce; les caractères qui l'en distinguent, sont une taille plus petite, une forme raccourcie et élargie en arrière; elle est entièrement d'un noir très-brillant, avec de longs poils fins et droits, espacés. La marge des élytres manque de la bordure du duvet blanc qu'on observe chez le *C. lavigatus*.

(42) CLERUS MOLLIFASCIA, elongatus, coriaceus, pilis albis et nigris dense villosus, niger, elytris violaceis.

fascia media circumflexa alba pilis mollibus formata; corpore infra pedibusque nigris, dense albo-villosis; capite convexo, coriaceo, inter oculos foveis duabus parvis rotundatis; antennis oculisque nigris; prothorace vix longior quam latior, ante medium transversim basique recte constricto; elytris granulosis, longitudine convexis, marginibus apiceque albo-villosis, linea laterali alba in pectore.

Long^o 6, lat^o 2 mill. — Mexico et Yucatan. Mus. Chevrolat, 2 exempl.

Cette espèce, ainsi que la suivante, devront être classées près des *C. Lævigatus* Nob. et *nebulosus* Spinola (mon., pl. 21, f. 3). Cette dernière me paraît être distincte de ces deux espèces.

(43) CLERUS SCAPULARIS, elongatus, albo pubescens, dense minute et rugose punctatus, nigro cœruleus; elytris in humero gibbosus, maculis duabus sanguiniis si-gnatis, 1^a humerali, 2^a apicale, albo villosa, in medio fascia transversa alba paululum arcuata, ante suturam abbreviata; capite verticule, modice convexo, palpis, labro antennis pedibusque rufis; oculis antice emarginatis fuscis; prothorace lateribus posticeque reflexo, antice truncato, convexo; scutello rotundato; elytris rugosis subscabroso costulatis, pedibus longe albo villosis.

Long^o 7 1/2, lat^o 2 1/3 mill. — Africa aust. Natal. Typus auctoris.

(44) AULICUS PLUTUS, *A. instabili* vicinus, elongatus, supra dense albo villosus capite et prothorace æneis crebre punctatis, palpis, antennis femoribusque villosis, tibiis tarsisque rutilis; elytris aureis in tertia parte apicale lœvibus minute punctatis, clathrate grosse striato-punctatis, corpore infra aureo nitido; capite in fronte leviter impresso, antice declive, truncato, minute punctato, villoso; oculis rotundatis fuscis; prothorace lateribus rotundato, linea longitudinali impressa ad sulcos duobus transversalibus juncta; scutello plano, rotundato.

Long^o 7, lat^o 5 1/3 mill. — Australia. S. O.

(45) AULICUS CORALLIPES, elongatus, læte cyaneus, crebre punctatus, pilis brevibus nigris tectus; ore, palpis,

antennis pedibusque sanguineis; mandibulis nigris; capite plano, verticale, crebre et ruge punctato, inter oculos rotunde impresso, oculis fuscis; prothorace lateribus mediis rotundato, crebre punctato, in medio triangulariter depresso, antice arcuatim basique recte constricto; scutello transversim rotundato; elytris antice recte truncatis, posticeque fere glabris nitidis, punctato striatis (striis contiguis, transversim plicatis); corpore infra viride albo villoso, trochanteribus nigris.

Long^o 8, lat^o 3 1/2 mill. — Tasmania. Mus. Mnischek, Chevrolat.

Cette espèce ressemble à l'*A. soveolatus*, New., mais celui-ci est entièrement bleu, plus étroit et plus allongé.

(46) **AULICUS CHRYSURUS**, elongatus, nigro pilosus, niger nitidus; elytris basi glabris, obsolete 4 gibbosum, medio punctato-striatis, ultra anguste sulcatis et in apice chrysaeis, femoribus anticis violaceis, ore, palpis, antennis, tibiis tarsisque anticis rubris; capite verticale æneo crebre punctato, villoso, antice truncato et transversim sulcato; prothorace convexo in disco rotunde depresso, in margine antico basique constricto; elytris basi recte truncatis, parallelis, singulatim rotundatis; abdomine nigro æneo-nitido punctato, femoribus modice crassi pedibus villosum.

Long^o 8, lat^o 3 mill. Australia. Mus. Mnischek, Chevrolat.

(47) **AULICUS BASICOLLIS**, elongatus, parallelus, niger, capite, dimidio antico prothoracis rubro, antennis pedibusque flavis, elytris basi modice gibbosum; capite verticale, sat lato, convexiusculo, antennis, vix prothoracis basin longis, gracilibus, tribus ultimis articulis, planis, lenticularibus, oculis lateralibus oblongis, nigris; prothorace subquadrato, antice posticeque truncato, supra basin transversim sulcato, rufo, fascia postica nigra dimidiata partem occupante; scutello parvo, transverso nigro; elytris parallelis, singulatim rotundatis basi gibbosum, punctato-striatis, corporeque infra nigro-piceis.

Long^o 2 1/2, lat^o 1 1/2 mill. — Ins. Cuba. Mus. Gundlach.

(48) **AULICUS ALBOGUTTULATUS**, elongatus, parallelus, fuscus, elytris cinereis, macula laterali media, antice bifurcata, secundum marginem in humero anguste ducta,

dein versus scutellum disposita, ad fasciam apicalem juncta, in illa fascia notulis sex albis, quatuor transversim dispositis, duobusque infra; capite verticale, convexiusculo, notulis quinque albis, tribus anticis, duabus supra oculos, antennis pallidis, brevibus, tribus ultimis articulis, planis lenticularibus; prothorace quadrato, convexiusculo, notulis quatuor albis; scutello punctiforme fusco; elytris parallelis, singulatim rotundatis, distincte striato punctatis; pedibus pallidis.

Long° 2 1/2, lat° 1 1/3 mill. — Ins. Cuba. Mus. Gundlach.

(49) *AULICUS BILINEATUS*, elongatus parallelus, niger, capite prothorace pedibusque rufis, in elytris lineis duabus flavis, capite verticale, elongato, convexo, sat lato, antennis rufis, prothoracis basin vix longioribus, tribus articulis ultimis crassis æqualibus, oculis lateralibus, oblongis, nigris; prothorace quadrato, convexo, antice posticeque truncato, supra basin transversim sulcato; scutello punctiforme, rotundato, transverso rufo; elytris parallelis, singulatim rotundatis, punctato-striatis, in singulo linea media elevata flava; pedibus corporeaque infra flavis.

Long° 3, lat° 1 2/3 mill. — Ins. Cuba. Mus. Gundlach.

(50) *OLESTERUS CRUENTATUS*, *O. Australi* vicinus, elongatus, breviter et dense villosulus, confertim granulosus, cæruleo obscurus viridescens, notulis duabus, fasciaque tenue media arcuata in elytris albis (prima centrali punctis duobus formata, secunda laterali obliqua ad maculam sanguineam proxima), fere quarta parte apicale elytrorum cinerea; pedibus rubris; capite granuloso viridi-cyaneo, truncato; mandibulis, palpis antennisque sanguineis; prothorace granuloso viridi-cyaneo, globuloso, basi attenuato, supra basin constricto, recte truncato, lateribus anticis infra albo velutino, linea longitudinali angusta signato; scutello parvo, plano rufo; elytris planiasculis, cylindricis, apice paululum latoribus, scabris, post scutellum callo elongato ornatis; pectore rubro; abdomine cyaneo nitido ♀.

Long° 9, lat° 3 1/3 mill. — Australia. Mus. Chevrolat.

(51) *ZENITHICOLA FUNESTUS* (Schauf.) brevis, latus, elongatus, niger albo villosus, capite piano, minute punctato,

(A. Chevrolat.)

palpis nigris, antennis nigris 1^o articulo rufo, clava triarticulata; prothorace lateribus mediis sub-angulato, coriaceo, antice in medio depresso, scutello punctiforme albo; elytris clathrato-striatis, basi oblique elevatis, in tertia parte apicale glabris nitidis, fasciolis tribus rectis albis, prima dorsale media, secunda laterale proxima tertiaque ad apicem; corpore infra pedibusque nitidis punctulatis, albo villosis, macula pectorale et laterale parva, postica alba.

Long° 11, lat° 5 mill. — Australia New South Wales.

(52) *ZENITHICOLA SOSIUS*. *Z. funestæ* valde affinis, brevis, latus elongatus, niger, albo griseo parce villosus; capite plano, nigro virente, lateribus marginato, confertim punctulato, mandibulis nigris, antennis nigris, clava triarticulata fusca, prothorace subrotundato, punctato, rugis obliquis, lateribus longe albo-villoso, macula rotunda alba in angulo antico signato; scutello albo; elytris longius foveato-striatis, in humero et in medio basis elevatis, apice glabris, nitidis fasciolis tribus albis, prima dorsale recta secunda laterale infra e punctis quatuor formata, tertia apicale rotundata; corpore infra nitido, macula pectorale transversa ad latera postica, pedibus albo villosis.

Long° 12, lat° 5 1/2 mill. — Australia. Mus. auct.

(53). *TRICHODES DREGEI*, elongatus cyaneus, supra nigro et fusco longe infraque albo villosus; capite plano, recte truncato, læte cyaneo, crebre et rugose punctato; palpis antennisque (1^a art. rufescente) nigris; prothorace fere quadrato plano, postice modice attenuato, antice tenue constricto, crebre rugeque punctato, longe piloso; scutello punctiforme; elytris parallelis truncatis, in sutura breviter spinosis, modice et æqualiter convexis, punctato-striatis, striis subapproximatis, maculis tribus lateralibus; 1^a arcuata extus humerum et 3^a rubris, media recta flava; abdomine violaceo.

Long° 7, lat° 2 mill. — Cap. Bon. Sp. a Dom. Dregeo olim missus.

TRICHODES AULICUS, Kl. mon., p. 338.

Dej. cat. 3, p. 426, cap. Bon. Sp.

Trichodes Dejeani, Drège.

Aulicus Spin. mon 1, p. 320, t. 31, f. 4, Cap. Bon. Sp.

L'espèce publiée par Spinola me paraît très-distincte de la précédente, ces deux espèces me sont inconnues.

Les quatre espèces à point huméral se distinguent par les caractères suivants :

Le *Leucopsideus*, l'espèce la plus connue, a trois bandes réunies à la suture ; la première et la deuxième sont droites, assez larges, et se dirigent obliquement en dessous, sur la suture.

L'*Hypocrita* lui ressemble, est plus étroit, aplani, d'un jaune pâle, les deux bandes sont isolées de la suture, étroites, un peu élargies en marge, amincies, flexueuses et dirigées obliquement et d'une manière anguleuse vers l'extrémité de la suture ; les élytres sont tronquées.

Le *Zaharæ* est d'un jaune pâle, mais d'une couleur un peu plus foncée que le précédent ; les deux bandes noires sont droites ; la première est large vers le milieu et se flétrit sur la suture ; la deuxième est droite et légèrement échancrée en dessus, près de la suture.

Le *Sanguinosus* est d'un rouge vif ; les deux bandes ne sont réunies à la suture que par l'élévation étroite de celle-ci ; le sommet est subtronqué ; la première bande noire est brièvement anguleuse en dessous, sur la suture ; la deuxième est anguleuse en dessus, au milieu de l'étui.

Toutes quatre ont une bande ou tache apicale plus ou moins développée.

(54) TRICHODES RUFITARSIS (Gebler) *T. Zebræ vicinus*, elongatus, parallelus, subtruncatus, niger, capite, prothorace tibiis tarsisque dense rufo villosis ; elytris flavo-rubris, fasciis tribus nigro holosericeis rectis 1^a angusta ante — 2^a lata post medium — 3^a apicale opaca ; capite convexo, fusco-virente, vertice convexo, antice truncato, glabro ; mandibulis nigris, palpis antennisque rufis, pro-

thorace viride dense rufo-aurantiaco villoso, linea longitudinalis glabra notato; scutello transversim rotundato plano viride; elytris reticulatim punctatis femoribus crassis, nigro virenti-obscuris; pectore dense fulvo hirto; abdomine nigro nitido, lateribus flavo.

Long^o 15, 19, lat^o 5, 5 1/2 mill. — Caucasus à Dom. Mniszewichio.

Cette espèce se distingue du *Zebra* et du *Crabroniformis* par les bandes des élytres droites et larges, n'ayant aucune jonction avec la suture; l'épaisse villosoité du prothorax, des jambes et des tarses la sépare nettement des deux autres espèces.

TRICHODES : caractères des quatre espèces suivantes à élytres parallèles tronquées.

Le *Zebra* est d'un jaune pâle; la première bande est étroite, droite, réunie en dessus et en dessous à la suture elle est séparée de la marge; la seconde bande est large, droite, est d'un beau noir velouté et atteint la marge.

L'Olivieri est rouge, plus étroit; la première bande n'atteint ni la marge ni la suture; la seconde bande est élargie en marge droite, amincie sur la suture, en dessus d'un noir velouté.

Le *Rufitarsis* de Crimée est revêtu d'une épaisse villosoité rousse sur la tête; le prothorax, les jambes et les tarses, les deux bandes noires sont droites.

Le *Crabroniformis* est un peu moins parallèle; la troncature des élytres est plus nettement marquée; la première bande est droite, un peu échancrée au milieu, en dessous, et anguleuse des deux côtés sur la suture; la deuxième est large, échancrée en dessus et en dessous.

Le *Sinæ* participe de cette division par la longueur et le rétrécissement de ses élytres; leur sommet est arrondi.

(55) **TRICHODES SINÆ**, elongatus varie punctatus nigro hirtus, lâete cœruleus, elytris rubris, fasciis tribus rectis, duabus nigris, vix suturæ junctis, ultima apicale cœrulea;

capite minute punctato, postice convexo, recte truncato, transversim antice sulcato, inter oculos foveis duabus impressis; autennis obscure rufis, clava triarticulata nigra, oculis oblongis nigris; prothorace antice basique transversim constricto, antice semi-circuiter postice recte truncato, lateribus anticis rotundato, pilis longis albis marginato; scutello rotundato cyaneo; elytris punctis mediocribus subseriatim impressis, versus apicem paululum ampliatis et singulatim rotundatis in medio basis fasciola angusta signatis, corpore infra pedibusque laete cœruleis.

Larg^o 16, lato. 6 mill. — China borealis.

Cette espèce fait le passage du groupe *T. Olivieri* nob. au *T. Gulo*; les élytres, presque parallèles, sont arrondies à l'extrémité.

TRICHODES GULO (Parreys), ressemble beaucoup au *Cra-broniformis*; néanmoins, les élytres ne sont nullement parallèles ni tronquées; elles sont un peu élargies vers le sommet. Les deux bandes sont plus larges, anguleuses en avant et en arrière, liées entre elles par la suture jusque près de l'écusson; elles sont d'un beau noir velouté; le prothorax est tantôt bleu ou vert, à villosité légère plus fournie que chez le *T. Crabroniformis*.

Long^o 13, 18 larg^o 5, 6 mill. — Corfou, 4 ex.

A mon avis, c'est une espèce différente se rapportant au groupe du *Favarius* et la première comme étant très-grande.

Le *T. Lafertei* vient en second ordre pour la taille; il est plus large, plus long et plus aplani que le *Favarius* type; les longs poils du prothorax sont d'un blond fade; les bandes des élytres sont d'un noir profond, granuleuses; la première a la forme d'une ancre épaisse, et la tache apicale est étroite et allongée.

Il existe des exemplaires de Grèce, d'Asie mineure et d'Égypte, à bandes bleues ou vertes, à longs poils blancs, qui se rapprochent beaucoup du *Favarius*, mais dans l'état

actuel d'incertitude, il est nécessaire d'attendre pour se prononcer sur la validité de ces espèces.

TRICHODES VIRIDIFASCIATUS, Chv. An. Fr. 1843, p. 40.

Phedinus Spin., tab. 31, fig. 1, D.

Cette espèce remarquable a été mise en synonymie au *T. favarius*. C'est le *T. phedinus* Spinola tab. 31, fig. 1. D. Cet auteur l'indique comme propre à la Russie méridionale. Je l'ai reçue de M. Lavaud, lieutenant de vaisseau, à son retour d'un voyage en Orient. Cette belle espèce n'a que les dessins du *T. favarius*; elle est plus large, plus aplatie que cette espèce; sa belle couleur verte, à reflets bleuâtres sur les côtés, se détache du jaune orangé qui décore ses élytres; celles-ci sont chargées, ainsi que le prothorax, d'une ponctuation serrée, rugueuse, transversalement ridée; une ligne longitudinale lisse et brillante du prothorax est déprimée sur la base et est limitée sur le milieu; de plus, la tache apicale de l'étui ne couvre pas totalement l'extrémité et laisse voir un liseré jaune au sommet. Cette espèce, par ce caractère, se rapproche de mon *T. affinis*; elle en est distincte. Les points des élytres sont profonds, serrés, disposés en séries longitudinales; deux sortes de poils blancs recouvrent le corps en dessus, les uns longs et espacés, les autres denses et courts.

Long° 19, lat° 4 3/4, 5 mill. — Turquie, Russie mér.

(56) **TRICHODES CAUCASICUS**, *T. viridifasciato* affinis, elongatus, tenue fulvo hirtus, viridis, labio, mandibulis, antennis oculisque nigris; prothorace lato, viride, inæquali plano, fortiter punctato, transversim trisulcato, sulcis mediis arcuatis, depressis; scutello rotundato, viride; elytris sanguineis, fasciis duabus, 1^a anchoraliformie, ante; — 2^a transversa lata post medium, macula scutellarie quadrata, macula apicalie rotundata ad suturam anguste fasciæ junctis lâete cyaneis; corpore et pedibus viridibus crebre punctatis, segmento ultimo apice et omnino supra croceo, femoribus posticis modice inflatis, tibiis rectis, cinereo

limbatis, posticis longioribus paululum arcuatis, ♂ ♀.

Long^o 9, 12, lat^o 2 1/2, 4 1/2 mill. — Caucasus, a D. Mniszech donatus.

(57) TRICHODES SEXPUSTULATUS, elongatus, angustus, albo villosus, rugosus, dense punctatus, elytrorum maculis lateralibus transversis rubris : prima humerale, secunda in medio trigona, tertiaque ante apicem recta ; capite cæruleo, sat fortiter punctato, pilis erectis albis tecto ; palpis piceis ; mandibulis, antennis oculisque nigris ; prothorace elongato, in disco plano, punctato, longitudine costato (costa ad basin sulcata), basique transversim sulcato ; scutello parvo, rotundato ; elytris crebre punctatis, subseriatim striatis ; corpore infra dense albo villoso, pedibus in minute punctatis viridibus.

Long^o 9, lat^o 3 mill. — Syria mus. Reiche.

Cette espèce n'est peut être qu'une variété du *T. affinis*, où le vert a envahi la plus grande partie des élytres et où il ne reste plus que trois taches latérales rouges.

Le *T. affinis* d'Égypte, que j'ai décrit comme étant l'espèce de Dejean, ressemble insinément au *T. viridisfasciatus*; la forme est moins longue, plus convexe, les élytres sont d'un beau rouge ayant deux bandes d'un beau vert, réunies entre elles sur la suture, la tache apicale est arrondie et est détachée du sommet par un liseret rouge ; la ponctuation, très-fine et très-serrée, sans apparence de stries, la distingue facilement de l'autre espèce ; les longs poils blancs du dessus du corps sont plus longs et bien moins abondants.

Je rapporte à cette espèce un exemplaire de Syrie, plus petit, à élytres allongées un peu aplaniés, rouges à bandes et taches apicales vertes, c'est mon *T. subapicalis*.

(58) TRICHODES GEORGIANUS, *T. Apiario* vicinus, elongatus, convexus, nigro-cyanus, elytris flavis, fasciis duabus transversis, maculaque apicale nigro-cyanis : 1^a fascia ad scutellum oblique juncta in sutura postice angulata ; 2^a antice posticeque medio angulata, antice

posticeque intus emarginata; capite convexo, minute punctato; mandibulis, antennis oculisque nigris; prothorace elongato, lateribus posticis, attenuato et stricte constricto, basi transversim sulcato, medioque fisco; abdomine convexo nitido minute punctato, ♀.

Long° 12, lat° 5 mill. — Georgia asiatica a D. Motschulsky. donatus.

(59) *TRICHODES EPHIPPIGER*, elongatus subplanus, supra nigro hirtus, infra albo-villosus, læte cyaneus; elytris lata fascia, infra basin, marginibus scutelli adnexa, in regione humerali adunca, postice subangulata, fasciaque ultra medium, angusta, recta, suturæ non adnexa, prima et secunda ante marginem interruptis; capite dense punctulato, inter oculos sulcis duobus tenuibus; antennis nigro fuscis; prothorace elongato, plano, linea longitudinale postice sulcata, transversim in recte biconstricto, inæqualiter sat dense punctato; femoribus posticis crassis; instrumento capulari rubro, ♂.

Long° 11, lat° 5 mill. — Erzeroum, mus. E. et T. Deyrolle; Diarbekir, mus. Chevrolat.

(60) *TRICHODES KINDERMANNI*, elongatus, planus, sat latus cyaneus, longe albo villosum, elytris coccineis subtruncatis, maculis quatuor, duabus ante-fasciaque ultra medium, versus suturam abbreviata duabusque apicalibus angulatis, nigris; abdomine nigro-virente nitido; femoribus crassis, tarsis, palpis antennisque rufis, clava nigra; capite convexo cyaneo, antice plano truncato, viride, prothorace elongato, lateribus mediis rotundato, antice posticeque extus transversim constricto; scutello rotundato cyaneo; elytris confluenter subpunctatis, costis duabus in singulo; oviducto rubro, ♀.

Long° 14, lat° 4 1/3 mill. — Asia minor, Syria a Dom. Gaillardot missus, 2 ex.

Les *Trichodes axillaris*, Geb., *Carceli* et *Kindermannii* nob. ont même forme aplanie, des élytres d'un jaune orange, avec quatre taches diversement tracées.

L'*Axillaris* a deux bandes transversales vertes; la première, sinuée en dessous, amincie en dessus, avant le milieu; la seconde droite, sinuée au delà du milieu, l'une et l'autre n'atteignent pas la marge; deux taches, l'une

large et anguleuse en dessous, l'autre au sommet de la suture : celle-ci est étroitement relevée et verte.

Le *Carceli* a deux bandes transverses bleues ; la première est en forme d'ancre, n'atteint pas la marge ; elle est légèrement échancrée au bord inférieur ; la deuxième est entière, élargie en avant, et en arrière au centre ; l'une est située avant le milieu et l'autre au delà ; elles se relient entre elles par la suture depuis la tache scutellaire jusqu'à la tache apicale.

Cette espèce est rapportée dans le catalogue de MM. Gemminger et Harold, tome XI, p. 17, au *nobilis* de Kl. ; elle n'a aucun rapport avec elle ; la pl. XXX, fig. 5 de Spinola représente deux espèces ; la lettre A paraît se rapporter à mon *Lafersei* de Constantinople, et la lettre B au *sanguineo-signatus* que je ne possède pas.

TRICHODES LAMINATUS ♀ est, avec le *Sipylus*, l'une des espèces qui ont, à l'extrémité des jambes postérieures, une lamelle ; mais dans celle-ci, cette lamelle est longue et étroite, cornée, obscure ; on l'a mise en synonymie à l'*Ammios*, mais elle serait mieux placée avec le *Sipylus* ; la femelle (4 ex.) est plus parallèle d'élytres ; elle est verte, plus nettement tronquée ; elle offre trois taches d'un jaune orangé, la première au milieu peu après la base, la deuxième latérale droite, remontant la marge jusqu'en avant de l'épaule et la troisième latérale, oblique, avant le sommet ; le dessus du corps et surtout le prothorax sont revêtus d'une longue et abondante villosité blanche ; sur ce dernier il existe une ligne longitudinale étroite et brillante qui est sillonnée sur la base ; ce caractère est plus nettement accusé que chez le *T. sipylus* ; *l'angustus*, loc. cit., p. 41, pourrait bien être le ♂ de cette espèce.

Trichodes laminatus, An. fr. 1843, p. 40 ; Anatolia.

Long^o 10, 11, larg^o 3 1/3, 3 1/2 mill.

(61) **TRICHODES ATTICUS**, brevis, latus, crassus, viridi-cyanus, capite et prothorace lanugine densa alba tectus, antennis aurantiacis, elytris ruge et reticulatim punctatis,

maculis quatuor elongatis læte flavis 1^o media, transversa margine adnexa ; 2^o obliqua, ante apicem posita, etiam ad marginem adnexa, illis ante suturam abbreviatis ; femoribus crassis, crebre punctulatis, tibiis rectis posticis curvatis, dense albo villosis, tarsis albidis, unguiculis nigris ; corpore infra viride, ♀.

Long^o 9 1/2 10, lat^o 4 1/2, 5 mill. — Græcia, Athènes.

J'ai reçu cette espèce de M. de Kiesenwetter ; elle a la forme épaisse de l'Ammios, est plus courte, plus ramassée ; les quatre taches, d'un beau jaune orangé, sont disposées comme chez le Sipylus ; mais elles sont un peu plus larges.

(62) *TRICHODES x LITTERA*, elongatus, crebre dense punctatus, viridis, antennis elytrisque croceis, fasciis quatuor viridibus, fascia prima basale, suturæ juncta ad secundam in margine ducta et litteram x efficiente, tertia ultra medium sita, postice pone suturam emarginata, quartaque apicale ; femoribus posticis crassis, aduncō longo tenue arcuato intus signatis ; prothorace elongato, plano, dense punctato, granuloso, lateribus mediis subangulato, pilis longè albis, ornato ; elytris modice convexis, dense punctatis, in dimidio longitudinale punctato-striatis atque costatis.

Long^o 7 2/3, lat^o 2 2/3. mill. — Algeria a Dom. Lethierry missus.

Le *Trichodes flavicornis* Ger. est distinct de l'Ammios, Il est très-étroit, bien plus allongé, les dessins d'un jaune orangé sont obliques, plus étroits, plus longs et autrement tracés ; de plus, le prothorax est très-convexe et n'est nullement sillonné longitudinalement comme cela se voit chez l'Ammios.

(63) *ELEALE SPECULUM*, elongata, supra pilis erectis vage distributis, infra albo-lanuginosa, ruge et dense punctata, nigro-ænea, prothorace æneo-violaceo, elytris basi apiceque nitidis, fere glabris ; æneo-violaceis ; capite antice depresso, recte truncato, inter antennas sulcato postice transversim convexo, puncto frontale plano, æneo, crebre minuteque punctato ; antennis basi nigro-æneis, apice

aurantiacis; oculis pallidis; prothorace elongato antice posticeque recto, transversim bisulcato, modice convexo, lateribus mediis rotundato, rugis transversalibus, foveolaque lateralí signato; scutello rotundato; elytris longis parallelis, antice rectangularis, attamen in humero rotundatis, antice nitidis, apice nigris nitidis, punctatis basi intus gibbis, intra humerum depresso, punctato-striatis, inter costas duabus longitudinalibus, striis 3; corpore infra breviter albo lanuginoso; femoribus longe clavatis, tibiis paululum curvatis, rubro igneis, tarsis nigris ♀.

Long° 11, lat° 3 1/5 mill. — Van Diemen Land a Dom. Stark missus, typus auctoris.

(64) ELEALE HERBACEA, elongata, viridis, crebre punctata, punctis reticulatis, supra pilis erectis nigris vase tecta, infra albo tenue villosa, palpis, mandibulis antennisque nigris; capite declive, tenue vaseque punctato, antice truncato, transversim bituberculato, lateribus supra sulcato; oculis rotundatis, modice convexis nigris; prothorace elongato, antice posticeque truncato, transversim bisulcato, lateribus mediis bene rotundato, transversim rugoso, sulco laterale ornato; scutello circulare albo; elytris elongatis, parallelis, ad basin distincte punctatis, punctis densis, reticulatim scabrosis; pedibus elongatis abdomine sat lato ♀.

Long° 10, lat° 2 3/4 mill. — Australia, Launcester, a D. Spence missus.

(65) ELEALE ALBO-SCUTELLATA, elongata, angusta, supra parce pilosa infra dense albo villosa, rugosa, distincte punctata, viridi-cyanea, palpis antennisque nigris; capite lato punctato, antice excavato, inter antennas sulcato, medio posticeque nigricante, tuberculo nigro frontale signato; oculis fuscis; prothorace elongato, antice, posticeque truncato, lateribus mediis rotundato, obsolete transversim bisulcato, minutis rugis transversalibus ornato; scutello medio, triangulariter niveo, marginibus reflexis nigris; elytris longis, subparallelis, planiusculis, intra humerum paululum depresso, singulatim rotundatis; corpore infra pedibusque dense albo-villosis. ♂ et ♀.

Long° 10, lat° 3 1/3 mill. — Australia, mus. Chevrolat.

(66) ELEALE TASMANIAE, elongata, violacea supra pilis

tenuibus rectis nigris, infra longe lanata alba, in pectore et in femoribus, sed in abdomine tomento albo, notulisque nigris insignita; capite rubro, minute punctato, pilis nigris hirsuto, antice truncato, linea longitudinale angusta antice oblique impressa; antennis nigris, clava quinque articulata, articulo ultimo valde emarginato; oculis rotundatis, nigris emarginatis; prothorace viride, in margine laterale violaceo-tincto, convexiusculo, lateribus mediis bene rotundato, antice posticeque recto, vix distincte transversimque bisulcato, dense punctato, rugis transversis aliquot, sulco laterale elongato, foveis duabus in medio longitudinalis una in basi, altera ante medium; scutello parvo, rotundato viride; elytris violaceis, parallelis, singulatim rotundatis, convexis, dense in ordine punctatis, apice reticulatis, intra humeros depresso; femoribus crassis, æneo violaceis, tibiis viridibus, tarsis nigris. ♂.

Long° 8 1/2, lat° 3 1/4 mill. — Tasmania, mus. Chevrolat.

(67) *ELEALE SEMICHRYSEA linearis*, pilis erectis nigris, parce vestitus capite et prothorace aureis, crebre punctatis, hoc cylindrico, medio transversim biconstricto, transversim plicato, antennis, flavidis, clava infuscata; scutello aureo; elytris pectore et abdomine viridibus, pedibus gracilibus rubro-metallicis; capite antice plano, linea angusta lateribus tenue impressa, palpis oculisque nigris; prothorace longo, antice atque postice truncato; elytris planis, in humero callosis, intra humerum in medio, unisulcatis parallelis, singulatim rotundatis, sat fortiter rugeque punctatis; margine postico segmentorum abdominalium albo, tomentosis ♂.

Long° 5, lat° 2 mill. — Australia, mus. Chevrolat.

(68) *ELEALE? ANORMIS*, subelongata, latiuscula, coriacea, crebre punctata, viridi-cyanea; capite viride, reticulatim punctato, fovea frontale, antice recte truncato; labio transverso, aureo, mandibulis antennisque (brevibus) nigris, tribus ultimis articulis latioribus, ultimo vix emarginato; oculis rotundatis, reticulatis, fuscis; prothorace elongato, suboblongo, apicibus recto, in basi tenue sultato, rude scabroso; scutello rotundato, læte viride; elytris elongato-suboblongis, valde punctato-scabrosis, in sutura cæruleis, costis duabus suturalibus flexuosis; cor-

pore infra viride, punctato, albo-villoso; pedibus aureo viridibus, tarsis nigris.

Long^o 6 3/4, lat^o 2 3/4 mill. — Australia, Swan river. mus. Chevrolat.

(69) ELEALE ? BREVICORNIS, elongata, dense punctata, albo nigroque pilosa, capite et prothorace smaragdinis, elytris cyaneis punctato-granulatis, corpore infra albo lanatis, pedibus æneis, tibis longe albo-villosis, tarsis obscuris; capite declive, rude punctato; palpis antennisque pallidis, oculis triangularibus, elongatis nigris, antice emarginatis; prothorace elongato, ultra medium lateribus subangulato, antice basique constricto, in disco antice foveato, grosse et ruge punctato, extremitatibus cyaneo; scutello fere rotundato, plano, viride; elytris latis, modice convexis, singulatim rotundatis, seriatim punctatis (punctiis contiguis, reticulatis); pectore et abdomine viridibus, ano supra nitidissimo læte cyaneo. ♂.

Long^o 5, lat^o 2 mill. — Australie mér. mus. Mniszech, Chevrolat.

Cette espèce se placera avant l'*E. anormis*, avec laquelle elle a de grands rapports de forme et de constitution d'antennes; ce sont plutôt des *Aulicus*.

(70) ELEALE LANATA, *E. aspera*, affinis, elongata, granulosa, supra pilis erectis vage tecta, infra præsertim in latere pectoris et in abdomine albo lanata, scutello etiam albo; obscure ænea, sutura rubrofimbriata; capite declive, minute punctato, inter antennas transversim sulcato, linea longitudinale impressa, palpis et mandibulis nigris, antennis æneo-obscuris, duobus ultimis articulis nigris; oculis rotundatis nigris; prothorace longo, antice posticeque recto, prope margines transversim sulcato, lateribus mediis paululum rotundato, æneo obscuro colore violaceo repercutante, supra transversis rugis, foveis duabus lateralibus; scutello rotundato concavo; elytris parallelis longis, ad apicem suturam apertis, singulatim tenue 3 costatis; corpore infra valde lanato, pedibus villosis, femoribus æqualiter crassiusculis, tibiisque rubro metallicis, tarsis nigris ♀.

Long^o 11, lat^o 3 1/3 mill. — Van Diemen Land. mus. Chevrolat.

Ce sexe pourrait bien se rapporter à l'*E. Simplex*, le ♂ n'aurait pas l'écusson blanc.

(71) ELEALE? LATECINCTA ♂, elongata, pilis erectis albis vestita, rugose punctata, capite viride, labio, antennis, prothorace, fascia lata media in elytris abdomini neque rubris; elytris sat fortiter punctatis, pectore pedibusque (femoribus quatuor anticis apice rufescentibus), coeruleis, longe villosis prothorace longiore, cylindrico, antice posticeque coarctato.

♀ Differt, capite lato, prothorace breviore, lateribus anticis rotundato supra glabro, foveis duabus dorsalibus impressis, in elytris ultra fasciam medianam, puncto apicale rubro.

Long^o 4-5, lat^o 1 2/4, 2 mill. — Swan River.

Cet insecte a une grande ressemblance avec la *Lemidia festiva* West. (proc. Zool. Soc. 1852, p. 47. t. XXV, fig. 3), mais il est plus grand et a les pattes noires.

(72) ELEALE? DISPARIPES ♂, elongata, pilis erectis albis vestita, antennis, prothorace (transversim infuscato, antice posticeque sulcato), fascia media recta, suturæ interrupta, femoribus quatuor anticis ad apicem rubris; capite lato, viride, antice punctulato, vertice transversim convexo; prothorace elongato, cylindrico; scutello parvo rotundato; elytris coeruleis punctato-striatis, punctis reticulatis.

♀ Differt; prothorace latiore, lateribus anticis, rotundato, foveis 4 rotundatis, pedibus 4 anticis flavis, posticis viridibus.

Long^o 4, lat 1 1/3, 1 1/2. mill. — Swan river.

Ces deux espèces, dont les mâles ont le prothorax allongé et les yeux un peu moins saillants dans ce sexe que chez les ♀, constitueront probablement, par suite, une coupe générique à part.

(73) STIGMATIUM THANASIMOIDES, elongatum, validum, maximum, Thanasi multillario similis, capite indumento cinereo tecto, inter oculos nigro, coriaceo, antennis nigris, articulis triangularibus, ultimo lineare acuminato, oculis globosis, fuscis; prothorace vix longior quam latior,

lateribus rotundato, ante medium basique profunde sulcato, antice posticeque recto, nigro, coriaceo, lateribus posticeque albo tomentoso; scutello transversim rotundato; elytris in dimidia parte antica rubris et in postica nigris, fasciis duabus albidis, prima ambiente partem anteriorem nigram, secunda lata ante apicem; pectore et abdomine rubris, pedibus nigris, cinereo pilosis.

Long^o 14 1/2, lat^o 5 3/4 mill. — Ind. or. Malacca, mus. Chevrolat.

(74) *STIGMATIUM BASIPES*, elongatum longitudine convexum, griseo hirsutum; capite lato lurido, vertice infuscato, antennis gracilibus flavis, articulo ultimo piceo nitido; oculis rotundatis, fuscis, antice leviter emarginatis; prothorace rotundato, convexo, longitudine elevato, fusco-virenti, lateribus subangulose-rotundato, lateribus ante medium transversim et profunde et in basi ipsa sulcato, notula lateralí alba; scutello albido; elytris nigro fuscis, ante apicem lata fascia maculaque media laterale angulata griseis, in apice fuscis et in sutura breviter acuminatis, striis intus punctatis, usque ultra medium, tenue sulcatis; pectore nigro, lateribus albo, abdomen flavo, pedibus nigris nitidis, femoribus usque ad medium flavis, tibiis ad apicem griseis, griseo hirsutis, tarsis nigris.

Long^o 10, lat^o 3 mill. — India or. Java? Malacca. A Dom Horsfield et Lethierry donatus.

(75) *STIGMATIUM DIMIDIATUM*, elongatum, nigrum, nitidum, dimidio antico elytrorum, pectore et abdomine rubris; capite maximo minutissime strigoso, nigro nitido, antice albo, inter oculos carinula longitudinale, in vertice tenue sulcato, antennis piceis articulis apicibus pallidis, oculis globosis fuscis; prothorace antice lateribus basique arcuatim sulcato, antice posticeque recto, lateribus mediis rotundato, coriaceo, angulis posticis declivibus, rectangularis, acutis; scutello parvo, rotundato nigro; elytris fortiter punctato-striatis, punctis ad basin reticulatis, ultra medium decrescentibus apice nullis, atque intersticiis coriaceis; pedibus nigris, tibiis extus in apice tarsisque supra griseo pilosis.

Long^o 10, lat^o 4 1/2 mill. Cochinchina, typus auctoris.

(76) *STIGMATIUM NITIDICEPS*, elongatum, validum, holo-

sericeum, supra infraque villosum, capite et prothorace fuscis, nitidis, minutissime punctatis (illo marginibus medioque albo fimbriato et lineato; elytris fuscis, nitidis, punctato-striatis (striis sulcatis) apice acutis, fascia lata postica alba punctis minutis nigris signata; abdomine pectore lateribus pedibusque (femoribus usque ad medium nigris) flavo-rubris; capite antice leucophæo; mandibulis nigris; palpis et 1^o art. antennarum flavis; antennis nigris; oculis fusco-rufis; prothorace lateribus posticis rotundato, transversim recteque bisulcato.

Long^o 9, lat^o 3 3/4 mill. — Dorey. mus. J. Thomson, Chevrolat.

(77) *STIGMATIUM LEUCOCHILE*, elongatum, hirsutum, griseum, elytris basi fascialis duabus indeterminatis nigris prima medio, secunda ante apicem; capite nigro, nitido, convexo, antice usque ad oculos leucophæo, antennis gracilibus pallidis longe pilosis, tribus articulis ultimis elongatis, clavatis, piceis; oculis griseis, emarginatis; prothorace ante medium transversim sinuoseque et in basi sulcato, fusco-obscuro nitido, lateribus posticis rotundato, notula laterale albida, dense coriaceo; scutello cordiforme griseo; elytris parallelis striato-punctatis, striis integris rectis, paululum sulcatis, femoribus, tibiis (longe pilosis) abdomineque flavis, femoribus ad apicem, tarsis prothorace infra nigris, pectore piceo. ♂.

Long^o 6, lat^o 3 mill. — Ind. or. Siam. 2 ex. mus. Chevrolat.

(78) *STIGMATIUM BASIPENNE*, elongatum nigro-fuscum, griseo villosum; capite antennisque gracilibus, longe pilosis, rufis, prothorace transverso, antice medio subangulose protuso, basi truncato, reflexo, sulcato anguste rufo; elytris nigro-fuscis punctato-striatis, fascia basale transversa flava, fasciisque duabus linearibus griseis, antice in sutura angulatis, prima ultra medium, secunda ante apicem, pedibus nigro fuscis, dense griseo villosis, femoribus crassis. ♂.

Long^o 7, lat^o 3 mill. — Ind. or. Borneo.

Cet insecte porte dans les collections le nom de *Stigmatium humerale*; ce nom a été employé à désigner plusieurs espèces de cette famille et, ne le trouvant pas décrit, je lui ai substitué un autre nom.

(79) *STIGMATIUM FASCIATOVENTRE*, elongatum, tomentosum, pubescens, cinereum, in elytris fasciis duabus nigris, prima ultra medium, secunda ante apicem, tribus notulis formata, abdomine rubro, nigro-quadrifasciato, femoribus usque ultra medium pallidis; capite hirsuto, verticale, postice convexo, griseo, antice transversim sulcato; antennis flavis; oculis oblongis, reticulatis, fuscis; prothorace fere discoidale fusco, lateribus cinereo, ante medium arcuatim-basique recte-constricto; scutello parvo punctiforme; elytris fusco-cinereis, tomentosis, circa humeros vix distincte punctato-striatis, sed ultra serialim minute tuberculatis pectore flavo, genua nigra.

Long^o 6, lat^o 2 1/2 mill. — Australia, Moreton Bay, typus auctoris.

(80) *STIGMATIUM FLACESCENS*, planum, elongatum, flavidum, abdomine rubido, elytris flexuose nigro-trifasciatis, angulo humerale fuscescente, femoribus nigro maculatis; capite coriaceo, rubido, convexo, antice albo villoso, maculis duabus supra oculos albis, antennis gracilibus pallidis, articulis ultimis piceis; oculis globosis, nigris; prothorace breve, pilis aliquot longis albis signato, lateribus rotundato, sulcis duobus rectis, obsoleta costa longitudinale, maculis obsoletis sex fuscis; scutello concavo rotundato; elytris flavescentibus, planis, in angulo marginale acutis, apice emarginatis; abdomine segmentis postiscis anguste nigro-limbatis, ultimo lateribus macula nigra signato, femoribus posticis crassis, fusco maculatis.

Long^o 6 3/4, lat. 3 1/2 mill. — Nouvelle-Galles du Sud.

(81) *STIGMATIUM LINEALBA*, elongatum, tomentosum, longe pilosum, nigrum, palpis, antennis, femoribus in dimidia parte basale atque abdomine, flavis; capite antice, linea scutellari, fascia ante apicale (sub pilosa rufa) puncto laterale infra, albis; elytris parallelis, in dimidia parte basale obscurō-rufis, punctato-striatis, interstitio secundo seriatim tuberculato; capite nigro nitido, clava antennali nigra; oculis globosis, nigris; prothorace ante medium et in basi recte-constructo; scutello rotundato, nigro; elytrorum striis subcontiguis; pedibus nigris.

Long^o 5, 5 1/2, lat^o 2, 2 1/3 mill. — Australia, Moreton Bay, mus. Chev. 2 ex.

(A. Chevrolat.)

Espèce très-voisine du *T. Cursorius* Westw., plus petite et différente de dessin.

(82) **STIGMATIUM PALLIPES** elongatum, fuscum, griseo variegatum, pilis albidis vage vestitum, capite prothoraceque nitidis, minute crebreque punctatis; capite antice subarcuatim truncato, inter antennas tuberculis tribus elongatis foveisque duabus signato; labio transverso flavo; mandibulis arcuatis nigris; palpis et tribus primis articulis antennarum pallidis; antennis capillaribus nigris, longe pilosis; oculis magnis rufis; prothorace breve, lateribus valde rotundato, pilis dense griseo holosericeis antice tecto, punctisque majoribus impresso, in disco glabro, longitudine carinato et transversim bisulcato; scutello rotundato; elytris punctato-striatis, interstitiis elevatis, apice singulatim spinosis, dilute flavis, fasciolis quatuor obliquis vel angulatis griseo holocericeis; corpore infra rubro; pedibus (femoribus posticis medio crassis, supra, tibiisque medio fusco maculatis) coxisque pallidis.

Long^o 8, lat^o 3 mill. — Ind. or. Borneo, mus. J. Thomson, Chevrolat.

(83) **STIGMATIUM MISERUM**, elongatum, holosericeum, rufo brunneum elytris fasciis duabus nigris, tenue antice posticeque albo fimbriatis et variegatis, prima lata ultra medium, secunda apicale, fascia intermedia mutabile albo fusca; capite rufo, minute et dense punctato, postice convexo antice verticale albo, tenue marginato, paululum emarginato, inter antennas vix carinato, utroque leviter depresso; mandibulis nigris; palpis antennisque rufis; oculis majoribus fuscis; prothorace breve, lateribus rotundato, rufo, medio obscuro, transversim bisulcato, foveis quatuor dorsalibus rotundatis; scutello rotundato, parvo, rufo; elytris in sutura breviter acutis, basi costatis, interstitiis quadrato-punctatis, fascia parva apicale nigra marginibus medioque anguste albo notata; corpore infra, coxis pedibusque (pilosis) rubidis, femoribus a medio ad apicem nigricantibus.

Long^o 5, lat^o 2 mill. — Australie.

(84) **OMADIUS SEMICARINATUS**. *O. indicus* similis, valde elongatus, cylindricus, puberulus, olivaceus, politus, carina prothoracis postica in medio longitudinis abbreviata.

punctisque duobus elevatis signato, in elytris fasciis quatuor fuscis : prima ex humero ad suturam oblique ducta 2^a præcedente juncta a sutura ad marginem, ante medium, 3^a post medium sinuosa, 4^a ante apicem utrinque abbreviata ; pedibus immaculatis, tibiis posticis tarsisque omnibus carmineo-rufis ; capite postice olivaceo, antice leuco-phœo, carinula inter oculos ; mandibulis acutis nigris nitidis, antennis ferrugineis, clava 3 articulata fusca ; oculis approximatis globosis, fuscis ; prothorace cylindrico, transversim fortiterque biconstricto ; scutello minimo punctiforme fusco ; elytris cylindricis, basi tuberculato-striatis ; abdomine obscurō flavo quadrifasciato, ultimo segmento emarginato.

Long^o 11, 17, lat^o 3, 4 1/2 mill. — Molucca, a Doin. Lorquin abunde collectus.

Cette espèce doit précéder l'*O. Indicus*, avec lequel il a de grands rapports, elle offre une carène longitudinale entière, les élytres sont rougeâtres, les pattes testacées et les cuisses annelées de noirâtre, ce qui la distingue de suite de notre espèce.

(85) **OMADIUS NIGROPUNCTATUS**, elongatus, cylindricus, puberulus, longe albo villosus, cinereus, capite supra nigro, minute et transversim plicato, antice albo villoso, palpis, mandibulisque acutis, nigris, antennis nigris primo articulo rubro ; oculis approximatis, globosis, nigris, antice breviter emarginatis ; prothorace nigricante, coriaceo. antice posticeque profundius sulcato, limbo postico cincereo, longitudine carinato ; scutello declive rotundato ; elytris anguste striatis, striis basalibus punctatis, fascia lata ultra medium punctisque duodecim nigris, nempe : 1^o humerali 2^o infra in margine 3-4 ultra transversim positis, marginale arcuato, post fasciam et ante apicem duobus transversim positis, laterale elongato ; pectore, abdomine, femoribus (anticis in longitudine postica, posticis in dimidio apicale nigris) tibiisque (posticis tantum basi) rufis.

Long^o 10, lat^o 4 mill. — Cambodgia, ex mus. Chevrolat.

(86) **OMADIUS ANNULIPES**, elongatus, nigro-obscurus, prothorace longitudine carinato, elytris dorso planis, bispinosis, fasciis duabus luteis, pedibus, flavis, femoribus,

tibiisque nigro annulatis; capite supra granuloso, nigro, antice pallide fusco, labro recto, anguste albo, carinula inter oculos, mandibulis acutis, nigris, antennis capillari-bus fuscis, clava nigra; prothorace profunde bisulcato, basi interne marginato, lateribus subito breviter recurvo, carina longitudinale ad sulcos limitata; scutello fere rotundato; elytris fascia prima lata ante medium, secunda postice triangulata, striato-punctatis, punctis minutis æqualiter dispositis, femoribus nigro triannulatis, tibiis basi et in medio tarsisque nigris, posticis flavis.

Long° 8 1/2, lat° 2 mill. — Molucca, mus. Chevrolat.

(87) *OMADIUS PICTIPES*, elongatus, fuscus, elytris luridis punctato striatis macula quadrata infra scutellum, alteraque ultra medium in singulo extus arcuata notulaque infra suturam nigris; pedibus lividis, fusco-maculatis, femoribus posticis, medio crassis; capite lurido, fascia antica, lineaque longitudinale in vertice, fuscis, signato; labio, mandibulis (linea laterale lurida) palpisque nigris; antennis (duobus articulis primis flavis) oculisque fuscis; prothorace (paululum longior quam latior), transversim fortiter biconstricto, griseo, lineola laterale fusca, in dimidio postico costato; scutello rotundato, plano fusco; elytris in sutura acutis, in tertia parte apicale non striatis, macula communi nigra antica, in sutura ad scutellum ramulum obliquam ad humerum junctis; corpore infra fusco; tarsis pallidis, ♂.

Long° 9, 10, lat° 3 mill. — Nova Guinea.

(88) *OMADIUS NOVÆ-GUINEENSIS*, elongatus, tomentosus, griseo olivaceus, capite antice rufulo, limbo antico oculorum niveo, in prothorace, carina longitudinale medio interrupta, elytris intus tricostatis basique seriatim tuberculatis, fasciis tribus umbrinis, prima ante medium, e sutura ad humerum ducta, secunda post medium supra et infra medio attenuatis, tertia lata, ante apicem non margine adnexa; capite supra minute strigoso, nigro; mandibulis nigris, antennis nigro fuscis, articulis duobus primis pallidis, 3° elongato pallidulo; prothorace elongato, sulcis duobus transversalibus impressis, primo ante medium, secundo basale rectis; macula albida laterale antica; corpore infra albo-griseo; pedibus pallidis, tibiis posticis longe et vase pilosis, usque ultra medium obscu-

ris, abdomine nigro, limbo segmentorum anguste flavo.

Long^o 13 1/2, lat^o 4 mill. — Nova-Guinea, mus. Chevrolat.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'*O. Semicarinatus*; elle s'en distingue par la couleur des antennes et des jambes postérieures.

(89) **EPIPHLÆUS MARGINIPES**, elongatus, tomentosus, niger, elytris macula basale rufa, fasciis tribus et macula apicule albo argenteis; pedibus rubris femoribus supra nigro limbatis; capite antice cinereo, in vertice nigro, antennis fuscis, 1^o et 7^o articulis flavis, clava nigra; oculis globosis, fuscis; prothorace nigro transversim strigoso, basi sulcato; scutello triangulari fusco, elytris punctato striatis (circiter undecim striis) pectore rufo-obscuro abdome infra flavo, supra nigro, ♂.

Long^o 6 1/2, lat^o 2 1/3 mill. — Mexico, mus. Sallé, Chevrolat.

(90) **EPIPHLÆUS LIVIDIPES**, elongatus, holosericeus, capite thoraceque minutissime et densissime punctulatis fusco-aeneis, labio, palpis, antennis, pedibus (femoribus posticis crassis) abdomineque (piceo trifasciato) pallidis; elytris ad basin leucophæis, postice dorso albo-argenteo tomentosis, fasciis marginalibus tribus brunneis duabus posticis albo-guttatis; capite convexo, antice albo ciliato; labio quadrato, semi-circuiter emarginato et marginato; oculis globosis, fuscis; prothorace breve, postice profunde constricto; scutello holosericeo rotundato; elytris convexiusculis, subparallelis, singulatim rotundatis, ad apicem paululum latioribus.

Long^o 5, lat^o 1 1/2 mill. — Venezuela, mus. Sallé, Chevrolat.

(91) **EPIPHLÆUS QUADRISTIGMA**, modice elongatus, sat latus, tomentoso fuscus, albidulo variegatus, fascia transversa nigra in medio prothoracis, et in elytris fasciola ante medium circumflexa, maculisque duabus posticis in singulo, nigris, prima recta transversa ad marginem adnexa, antennis pallidis, articulis filiformibus, connexis, tribus ultimis foliaceis, lenticularibus fuscis, pedibus pallidis; capite plano lato, cineraceo, palpis oreque nigris; oculis magnis, lateralibus antice emarginatis fuscis; prothorace transverso, antice posticeque truncato, lateri-

bus breviter rotundato; scutello parvo longior quam brevior; elytris sat latis, brevibus, convexiusculis, singulatim rotundatis, fuscis, in humero et ante apicem albidis, punctato-striatis, interstitiis elevatis; tibiis in medio obsolete fusco-notatis.

Long^o 5, lat^o 2 1/3 mill. — Cuba, mus. Gundlach.

(92) *LEMIDIA XANTHOZONA*, elongata, valde coriacea, albo nigroque hirta, nigro opaca, ore, palpis, antennis pedibus rubris, in elytris fascia media anguloque suturale flavis; capite antice plano, postice convexiusculo, truncato, coriaceo, dense hirsuto; clava modice crassa, 3. articulata; oculis lividis; prothorace plano, antice posticeque recto, transversim bi-constricto, lateribus, rotundato; scutello punctiforme minuto; elytris modice convexis, parallelis, macula suturali elongata; abdomine.....

Long^o 7, lat^o 3 mill. — Australia, ex mus. auctor.

(93) *LEMIDIA PULVEROSA*, elongata, antice pilis brevibus albis modice tecta, capite in vertice thoraceque lurido fuscis, nitidis; elytris planis, pulverosis, fascia basale (bituberculata) maculaque suturale elongata, secundum suturam, ante apicem sita, fuscis, glabris; corpore infra albo; ore, palpis, antennis pedibusque flavis; capite fusco-rubido, supra convexo, antice albo setuloso, antice attenuato, protenso, atque recte truncato; antennis brevibus, clava rotundato; prothorace subcylindrico, fusco rubido, linea longitudinale obsoleta, linea laterale nigra, foveis pluribus impressa, antice posticeque truncato, tenue bisulcato; elytris paululum convexis, ad apicem paululum attenuatis, breviter truncatis, tenue punctato-striatis; abdome in medio longitudinis flavo.

Long^o 6, lat^o 2 mill. — Ind. or.

(94) *LEMIDIA SEMILUTEA*, elongata, curtula, angusta; flava, capite, oculis (magnis) prothorace scutelloque nigris; elytris planis, apice angulose apertis, vase minute atque tenue punctatis singulatim extus rotundatis, breviter albidio pilosis; antennis gracilibus, corpore infra pedibusque pallidis.

Long^o 3, lat^o 1 mill. — Ind. bor., mus. J. Thomson, Chevrolat.

(95) *HYDNOCERA FUNEBRIS*, elongata, curtula, crebre ru-

geque punctata, tota nigra, subnitida, elytris planis, tuberculis duobus infra scutellum signatis, capite lato, inter oculos breviter costato; antennis brevibus; prothorace elongato, extremitatibus truncato, lateribus mediis rotundato, ad basin tenue sulcato, in disco plurimis tuberalis notato; corpore infra nitido, pectore in medio tenue sulcato.

Long^o 3 1/2, lat^o 1 1/2 mill. — California or., mus. Thevenet, Chevrolat.

(96) HYDNOCERA BITUBERCULATA, elongata, nigra nitida, albo-villosa, elytris juxta scutellum bituberculatis postea depresso fere seriatim punctatis; fasciis duabus ante medium, in sutura circumflexis. et in apice albo setulosis, in margine et in sutura unisulcatis; corpore infra pedibusque nitidis, basi tibiis nigro longe villosis, quatuor anticus pallidis; capite viride minute punctato, inter oculos oblonge depresso, ore pilis albis tecto; antennis nigris; prothorace viride, cylindrico, antice et postice truncato, tenue bisulcato; scutello declive rotundato.

Var. A. Elytres n'offrant qu'une trace imperceptible du trait circonflexe blanc formé sur la suture, disparition complète de la partie apicale blanche; pattes roussâtres avec la base claire, Mexique.

Var. B. Je possède deux exemplaires de Teapa (Yucatan) recueillis dans le temps par feu L. Pilate, dont le prothorax et les élytres sont entièrement bleus.

Long^o 4, lat^o 2 mill. — Mexico, mus. Sallé, Chevrolat.

(97) HYDNOCERA QUADRILINEATA, elongata, breviter dense albo pubescens, tenue punctulata, æneo-obscura, elytris planis flavis in sutura ad apicem marginis angulose apertis, lineis quatuor angustis obscuris (una laterale altera suturale) pedibus pallidis villosis.

Long^o 4 1/2, lat^o 1 1/2 mill. — Yucatan (Teapa), a Dom. L. Pilate capta.

(98) HYDNOCERA NITIDICOLLIS, elongata, latiuscula, crebre punctulata, viridi-obscura, capite et prothorace æneis nitidis, palpis antennisque brevibus pallidis; elytris planis, parallelis, singulatim rotudatis, fuscia ultra

medium sita, recta, pallida; femoribus quatuor anticus crassis pallidis, supra æneo limbatis, pedibus posticis longis viridibus longe pilosis, tibiis quatuor posticis apice pallidis; corpore infra æneo virente. ♂?

Long^o 5, lat^o 3 mill. — Mexico, mus. Sallé, Chevrolat.

(99) **EURYMETOPUM CIRCUMFLEXUM**, *E. proteo* vicinum, elongatum postice paululum ampliatum, pilis nigris erectis vestitum nigrum nitidum, in elytris linea in medio basis recta, apice intus pone suturam uncinata, antice supra humerum ad marginem limitata, fascia media antice angulata, limboque apicali: flavis; tibiis gracilibus et tarsis pallidis; capite magno, vertice convexo, antice planiusculo, depresso, minute punctato, mandibulis, palpis oculisque nigris; antennis piceis; prothorace elongato, lateribus mediis rotundato, transversim bi-constricto, minute punctato; scutello rotundato plano; elytris intus anguste sulcatis, punctato striatis-corpore infra nigro nitido; femoribus posticis sat elongato crassiusculis. ♀

Long^o 5, lat^o 2 mill. — Chili, a D. Riehl missum.

(100) **TENERUS BINOTATUS**, elongatus, sanguineus, mandibulis, antennis (1^o art^o rufo), oculis, maculis duabus anticus rotundatis in prothorace, elytris (macula marginali et sutura anguste rubris), genua, tibiis tarsisque nigris; capite convexo, minute punctato, antennis serratis, oculis magnis; prothorace antice oblique cylindrice, basique recte truncato, antice posticeque transversim constricto, tuberculo centrali notato, minute ponctato; scutello transversim rotundato, sanguineo; elytris cylindricis, singulatim rotundatis rugosis, albo villosis, suturæ costa proxima elevata; corpore infra et femoribus sanguineis minute punctatis, genua nigra abdomine breviter albo villosis. ♀

Long^o 8, lat^o 2 1/2 mill. — Malaisia a Dom. Mnisech donatus.

(101) **ICHNEA RELIGIOSA**, elongata, postice paululum ampliata nigra, confertim reticulatimque punctata, capite et prothorace medio longitudinaliter flavo-univittatis; palpis, mandibulis, ore antennis, oculisque nigris; capite convexo, flavo, post oculos nigro, nervulis aliquot transversis, foveola parva verticali; prothorace elongato, cylindrico, lata vitta longitudinali flava, vitta lateralí ni-

gra, antice posticeque recte truncato, ante medium transversim tenuaque sulcato; transversim rotundato, flavo; elytris punctato granulosis, singulatim rotundatis, tricositis; corpore infra pedibusque nigris nitidis. ♀

Long^o 9, lat^o ad apicem 3 1/2 mill. — Mexico, Oaxaca. mus. Sallé, Chevrolat.

(102) **ICHNEA TRILINEATA**, *I. religiosæ* affinis, tenue villosa, elongata, postice modice latiora, nigra, opaca lineis tribus flavis, una in medio capitum duabus in prothorace (una in utroque latere); palpis mandibulatis ore oculis, antennisque nigris, clava articulis tribus, planis, latis, ultimo ovato subacuto, basi apiceque nitido; prothorace antice posticeque truncato, lateribus anticis, paululum attenuato, transversim et recte sulcato, lateribus posticis rotundato, fovea basali, linea longitudinali abbreviata et obsoleta notato; scutello transversim rotundato nitido; elytris punctato-striatis (multi-striatis), interstitiis elevatis; corpore infra pedibusque omnino nigris, villosis, abdomine ampio; ♀

Long^o 6, lat^o 3 mill. — Mexico, mus. Sallé, Chevrolat.

(103) **ICHNEA CIRCUMCINCTA**, elongata, nigro-opaca, undique crebre punctata, capite linea longitudinali antice ampliata, prothorace vitta laterali, flavis; elytris in sutura infra scutellum ad humeros flavo marginatis; epipleuris flavis; abdomine nitido fasciis transversalibus angustis, flavis; elytris postice paululum ampliatis in basi striatis. ♀.

Var. Magna feminibus, abdomine toto, vel partim flavis ♂.

Long^o 6, 9 mill, lat^o 1 1/2, 3 mil. — Mexico, mus. Sallé, Chevrolat.

(104) **PLATYNOPTERA ICHNOIDES**, elongata, tomentosa, plana, supra nigro-opaca, subtus nitida, apice paululum ampliata, capite longitudine, prothorace lineis tribus, lineaque humerali flavis; antennis nigris, 1^o art^o longo, sequentibus nodosis, pilosis, connexis, clava articulis tribus longis ♂.

Long^o 6 1/2, lat^o 2 1/2 mill. — Mexico, mus. Sallé.

(105) **PELONIUM MILITARE**, elongatum, planum, postice

rotunde ampliatum, crebre punctatum coriaceum, nigro et griseo pubescens, nigro-opacum, in prothorace vitta laterali lata et in humero macula angulari, ad dimidium epipleurum continuata flavis; clava triarticulata articulis longissimis elongatis, ultimo longiori.

Long^o 10, lat^o 4 mill. — Mexico, ex. mus. D. Sallé.

(106) **PELONIUM PENNSYLVANICUM**, *P. bicolori*, proximum elongatum, dense albido villosum, nigrum, prothorace sanguineo, lateribus et in basi, nigro-limbato; elytrorum fascia obliqua rubra ultra medium extus abbreviata; capite convexo, creberime punctulato, antennis nigris, clava 3 art. articulis magnis planis, duobus primis apicibus angulatis, prothorace coriaceo; elytris singulatim rotundatis, punctulato-granulosis; corpore infra pedibusque nigris ♂.

Long^o 5, lat^o 1 2/3 mill. — Pennsylvania, ex mus. auct.

Cette espèce a une grande analogie avec le *Pelonium subfasciatum*, mais le dessin du corps est entièrement brun clair.

(107) **PELONIUM STENOCHIOIDES**, elongatum, crebre punctatum, pilis erectis nigris supra tectum, cœruleum, elytris macula basale postice angulata, in margine linea laterale angusta, ad latam fasciam mediam juncta flavis; capite rotundato convexiusculo, antice arcuatim emarginato, palpis, labro, labioque flavis; antennis nigris, clava triarticulata, articulis latis planis; oculis nigris emarginatis; prothorace elongato cylindrico, antice lateribus anticis vix et in basi (reflexo) recte sulcato, dense punctato; scutello parvo nigro; elytris subparallelis, attamen ad apicem paululum latioribus modice convexis, singulatim rotundatis, in margine pilis tenuibus nigris simbriatis; corpore infra femoribusque viridibus dense punctatis, libris tarsisque nigris ♀.

Long^o 11, lat^o 5 mill. — Mexico, mus. Chevrolat.

(108) **PELONIUM PICIVENTRE**, elongatum pube densa alba vestitum, grosse punctatum, luridum, infra piceum, abdome latieribus minute maculato anoque pallidis, ore antennis pedibusque testaceis, prothorace vitta laterale fusca, elytris basi, maculis tribus lateralibus, punctisque qua-

tuor (duobus in singulo), ante apicem nigris ; capite obscuro, punctato, lineolis tribus inter antennas, alteraque anticale rubris ; prothorace lateribus posticis angulato, sulcis duobus transversis, sulco longitudinale, medio interrupto, foveis decem dorsalibus ; scutello rotundato, albo ; elytris singulatim rotundatis, punctis impressis ; corpore infra minute et confertim punctato.

Long^o 10, lat^o 3, 4 1/3 mill. — Ins. Cuba, a Dom. F. Poëy missus, mus. Gundlach.

(108) PELONIUM NIGROCLAVATUM, *P. piciventri*, affine, elongatum pube densa alba tectum, undique varie punctatum ; supra luridum, infra nigrum, labio, antennis, pedibus (femoribus nigro signatis), limbo postico segmentorum abdominalium anque pallidis : elytris fascia basale rubida, notulis quatuor in medio, fasciaque ultra medium nigris ; prothorace lateribus transversim infuscato, sulco centrale abbreviato ; scutello rotundato, rubido ; elytris pone scutellum ad basin breviter bicostatis, punctato-striatis, punctis subreticulatis ; corpore infra minute punctato nigro nitido ♀.

Long^o 8 1/2, lat^o 3 mill. — Mexico. Teapa, a D. L. Pilate donatus.

(110) PELONIUM INSIGNE, elongatum, postice ampliatum ; capite et prothorace aeneis, albo tomentosis, hoc foveis sex nitidis, 1, 4, 1 ; elytrisa basi ad medium lâete cyaneis, postice flavis, maculis tribus nigris, prima laterale, duabus secundum suturam ; tibiis infuscatis, dense villosis ; abdomine, clava oculisque nigris, antennis pedibusque flavis, abdomine.....

Long^o 9 1/2, lat^o 4 1/2 mill. — Ex mus. Servilleo emptus.

(111) PELONIUM LINEATOCOLLE, elongatum, validum, nigro hirtum, confertim et ruge punctatum, nigrum, capite antennis (clava excepta nigra), prothoraceque rubris, illo linea longitudinale lata nigra signato ; elytris nigro-cyaneis ; corpore infra nigro. ♀

Long^o 6 1/2, lat^o 2 1/2 mill. — California Mariposa, a Dom. Thevenet amice offertus.

(112) PELONIUM FILIOLUS, *P. lineatocolle* vicinum, minor et angustior, elongatum, parce pilosum, capite (in

vertice late nigro), antennis (clava nigra) et prothorace (linea longitudinale nigra) rubris ; elytris dense rugeque punctatis cæruleis ; corpore infra pedibusque nigris. ♂.

Long^o 4 1/2, lat^o 1 2/3 mill.—California Mariposa, a Dom. Thevenet acceptus.

(113) **PELONIUM SUBFASCIATUM**, elongatum, breviter pilosulum, fusco-pallidum, in elytris fascia media angusta pallida ; labro, antennis, pedibus corporeque infra testaceis ; capite fusco dense granuloso, clava antennarum articulis tribus longis, prothorace paululum longiore latitudine, medio obsolete basique recte sulcato, inflexo ; elytris costulis tribus lævibus rectis, interstitiis minute punctatis, transversim rugatis ♂.

Long^o 4 1/3, lat^o 1 3/4 mill.—Guadulpia, Pointe-à-Pitre, a Dom. Ferd. L'herminier olim missus.

(114) **PELONIUM BILINEICOLLE**, elongatum, punctatum, albo villosulum, pallidum, clava antennali, in prothorace lineis duabus, in medio elytri ante medium punctulo, ante apicem fascia obliqua flexuosa, utrinque abbreviata, prothorace infra et pectore, nigris ; scutello fusco ; capite rubido, inter oculos, fascia arcuata nigra ; punctato, convexo, inter antennas bifo veato ; oculis rotundatis, fuscis ; prothorace elongato, lateribus mediis angulato, ruge punctato ; elytris punctato-striatis, marginibus albo-villosis, pedibus glabris pallidis ; abdomine flavo.

Long^o 5 1/2, lat^o 2 mill.—Mexico, mus. Sallé, Chevrolat.

(115) **PELONIUM FLAVOMARGINATUM**, elongatum, dense albido villosum, nigrum, labio, palpis, margine prothoracis (antice oblique ampliato) elytrorum atque pedibus pallidis ; capite convexo, nitido, punctato, antennis oculisque nigris ; prothorace lateribus posticis subangustato, postice convexo, crebre punctato, extus basin utrinque foveato ; scutello parvo, punctiforme ; elytris nigro-opacis, punctato-striatis, anguste marginatis flavoque limbatis ; pedibus pallidis, tibiis basi extus nigricantibus ; corpore infra nigro.

Long^o 4 1/2, lat^o 1 1/3 mill.—Brasilia, Nov. Fribourg, ex mus. auct.

Cette espèce ressemble beaucoup au *P. flavolimbatum*

Sp.; elle est plus petite, très-étroite et s'en distingue par la bordure latérale du prothorax qui s'avance obliquement sur le milieu du bord antérieur.

(416) PELONIUM 4-NOTATUM, *P. humerali*, Sp. vicinum, elongatum, dense albo pilosum flavum; capite, in prothorace maculis punctiformibus octo (quatuor posticis transversim dispositis, in elytris maculis quatuor magnis (humerale lunata), duabus ante apicem rotundatis; elytris punctato-striatis (punctis æqualibus), interstitiis subcostatis; abdomine nigro fasciato.

Long^o 4, lat^o 1 2/3 mill. — Texas, ex itinere D. L. Pilate mus. auct.

(417) PELONIUM CIRCUMCINCTUM, *Creg. oculato* proximum, elongatum, albo villosum, nigrum, ore, palpis, clava antennarum, elytrorum marginaque sutura (ante apicem interrupta), apice, pectore, 1^o segmento abdominis pedibusque flavis; capite nigro, oculis sat approximatis rotundatis nigris; antennis nigris, 1^o art. rufo; prothorace flavo, elongato; elytris punctato-striatis dense pilosis.

Long^o 4 1/4, lat^o 2 mill. — Brasilia, ex mus. auct.

(418) ORTHOPLEURA SUTURALIS, elongato-oblonga, dense griseo pubescens et minute punctata, nigro-cærulea; labio, antennis pedibus abdomineque rubris; elytris fascia ultra medium arcuata, angusta flava in sutura late, apiceque rufis, clava antennale fusca ♂.

Long^o 9, lat^o 4 mill. — Mexico, mus. Sallé.

ORTHOPLERA DAMICORNIS, niger griseo villosus, prothorace rufo, nigro-marginato.

Tillus damicornis, Fab. Supp. Ent. Sys., p. 417, n^o 1, 2.
Pennsylvania.

Sys. El. 1, 282, p. 2. Lec. Syn., p. 33.

Enoplium damicorne, Say. ann. Ent., 3, pl. 41, Déj.

Cat. 3-428.

Orthopleura damicornis, Spin. Mon. 2, p. 80, t. XLII, f. 4.

Elytris confertissime punctulatis, tarsorum unguiculis intus basi calcaratis.

Enoplium thoracicum, Say. journ. ac., Phil. 3, p. 188.

Amer. Ent. 3-41.

ed. Leq. 151, 2.

Bimaculata, Mels. Proced. ac. Phil. 2, p. 307.

Var. A. prothorace nigro in elytris fascia ultra medium flava. Cuba.

B. prothorace rubro, elytris cœruleis. id.

C. id. elytris flavo limbatis. id.

D. id. elytris in sutura et in margine flavo limbatis. id.

Long^o 4, 12, lat^o 2, 4 mill. — Ins. Cuba, D. Gundlach.
Octo exempl.

DESCRIPTION

D'UNE NOUVELLE ESPÈCE D'OTHNIUS

ET D'UN NOUVEAU GENRE

DE LA FAMILLE DES OTHNIDÆ, L'UNE ET L'AUTRE DU
MEXIQUE,

Par M. Auguste CHEVROLAT,

Membre honoraire de la Société entomologique de France.

Le Catalogue Gemminger et Harold, t. III, p. 905, mentionne la famille 24 comme ne contenant qu'un seul genre, *Othnius*, de Leconte¹, composé des trois espèces suivantes : *O. guttulatus*, *umbrosus*, Lec. loc. cit. p. 103, la première de Californie, la seconde de Nebraska et le *Fasciatus* Bland Proceedings ent. soc. Phil. 1864, p. 253, de Virginie.

1. Leconte Class. col. I. 1861. p. 102.

A ces trois espèces, j'ajoute ci-après la diagnose d'une quatrième, originaire du Mexique, et je donne la description d'un nouveau genre propre à ce même pays, et qui doit probablement faire partie de cette famille.

OTHNIUS MEXICANUS, brevis, latus, crebre punctatus, æneus, elytris flavis, singulatim basi bi-gibbosis, fasciis duabus obscuris, apicale maculam rotundatam flavam, secundum suturam efficiens ; capite antice, pectore, abdome pedibusque flavis.

Long^o 10, lat^o 2 mill. — Mexico.

POLYPRIA¹, Gen. nov.

Character generis : *Caput* magnum rotundatum, antice truncatum, inter antennas, lateribus impressum, canthus ante oculos, planatus extus angulatus, palpi art. ultimo-securiforme. *Clypeus* angustus, transversalis. *Labrum* quadratum. *Antennæ* valde serratæ, infra canthum insertæ, undecim articulatae, 1^o subcylindrico, apice paululum latiore, 3^o longiore, 2^o parvo, latitudine æqualis longitudine, 4-10 triangularibus æqualibus, angulatis, undecimo plano, oblongo, acuminato; *oculi* globosi ampli fusi, ab angulo canthi emarginati; *prothorax* fere discoideus, attamen, antice in medio paululum angulose productus, postice recte truncatus, margine laterali declive, medio subangulatus, angulis posticis obliquis supra modice angulatis, *scutellum* parvum rotundatum, *elytra* modice elongatae, convexæ, singulatim rotundæ, *corpus* supra et infra minute punctatum. *Abdomen* quinque segmentis, duobus primis majoribus, interse æqualibus, retro truncatis, ultimo ogivale; *pedes* breves, approximatæ femoribus crassis, tibiis inermibus, tarsis quinque articulatis, art^o 1^o conico, sequentibus coarctatis, modice latis, unguiculis duobus brevibus recurvis.

Ce singulier genre se rapproche des *Derestenus*.

POLYPRIA CRUX RUFA, capite rotundato, convexo, rufo, minutissime punctato recte truncato, palpis rufis, mandibulis parvis nigris, clypeo transverso, labio quadrato,

1. πολύς, beaucoup; πρέων, scie.

antennis pallidis serratis ultimo oblongo apice acuminato, oculis magnis, rotundatis, sub cantho antico, plano, extus acuto, emarginatis, reticulatis fuscis; prothorace fere discoidale lateribus subangulato, declive, antice in medio paululum obtuse angulato, ante medium transversim sulcato, postice truncale, in basi bi-impresso, rufo, crebre punctato; scutello transversim rotundato rufo; elytris elongato-oblongis, fulvis, sat crebre punctutatis, breviter pubescentibus, fascia rufa ultra medium, suturæ ampliata, in apice et in scutello angulose continuata; pectore rubido, abdomine flavo, pedibusque pallidis, punctatis.

NOUVELLE ESPÈCE D'ÉCHINOTUS GENRE VOISIN DES SEPIDIUM

Par A. CHEVROLAT.

ECHINOTUS NATALENSIS, elongato-ovalis, niger, granulis sabulosis undique tectus, capite elongato, declive, antice verticale, antennis gracilibus; prothorace in dorso cornibus duabus erectis, cornu altera, antice producta breve furcata; elytris singulo seriebus tribus tuberculorum (duabus internis spiniferis); tibiis tarsisque gracilibus.

Long^o 10, lat^o 5 mill. Natal.

Cette espèce est plus petite que l'*E. Spinicollis* de Cast. Elle est relativement plus courte et plus large, la corne antérieure du prothorax est moins longue, fourchue à l'extrémité; les deux cornes sises sur la partie dorsale sont coniques et moins élevées.

Sp. nov. Lac. Gener. Col. V, p. 203.