

Nr 32/65

Nazwisko

Wiek 73 lata

Dzień śmierci

11.II.65

Sekcjonowany

w 24 godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. kora czół.
2. " centr.
3. " ciem.
4. " potyl.
5. most
6. opuszka
7. mózdzek

Użyte metody barwienia

Mrozik; Parafina  
Krezyl, v.G., Biels-  
chowsky, Perdrau,  
v.G.-orceina, Hei-  
denhain, Holzer

W. Krzemiński

<http://rcin.org.pl>

Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis universalis et ce-  
rebri. Hypertensio arterialis. Hae-  
morrhagia cerebro-meningealis. Fo-  
cus haemorrhagicus hemisphaeri sin.  
Nephrocardiosclerosis in stadio in-  
suff. circulat. et renum. Oedema  
pulmonum sub fine vitae.

Rozpoznanie anatomiczne

Haemorrhagia subarachnoidealis et  
adventriculos.

Rozpoznanie histologiczne

Haemorrhagia subarachnoidealis.  
Oedema cerebri. Senilitas.

W przestrzeni podpajęcznej wynaczy-  
niona świeża krew. Naczynia opon i m  
mózgu wypełnione krwią. W korze stan-  
gąbeczasty, rozlane opustoszenia ko-  
mórkowe, w zachowanych neuronach  
schorzenia przewlekłe. Znaczne prze-  
rzedzenie warstwy ziarnistej mózdz-  
ku, zaniki segmentarne i schorzenia  
homogenizacyjne komórek Purkinjego.  
W barwieniu srebrowym kora wszyst-  
kich okolic i warstw usiana bardzo  
licznymi plakami starczymi w róż-  
nych stadiach dojrzewania.

509  
pudło

130

W istocie białej obrzękowe rozsunięcie pęczków włókien i miejscami zatoki okołonaczyniowe. Ściany naczyń nie wykazują zmian międzyzycowych, raczej są ścięte i zanikłe.

lek.H. Lewicka-Wysocka