

Nr 38/62.

Nazwisko

Wiek

64 lata.

Dzień śmierci

11.II.1962 r.

Sekcjonowany

w..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

puszko 87

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

- 1.k.czoł.
pr.
- 2.zw.podst.
pr.
- 3.k.cent.
L.
- 4.wzgórze L
- 5.nigra.
- 6.opuszka.
- 7.rdzeń
szyjny.
- 8.rdzeń le-
dzw. z ano-
malią.

bl. O.

Użyte metody barwienia

1-7 mroziak, H - E,
krezyl, 8 parafina.

/A.Leśniewska/.

Mikrofotografie, rysunki

P. 227

Rozpoznanie kliniczne

Status praecomatosus. Dehydratio cum
acidosis et asotaemia. Emphysema
pulm alveolaris essentialis. Arterio-
sclerosis diffusa praecipue cerebri.
Myocarditis chronica fere compensata.
Oedema pulm sub finem vitae. Anaemia
gravis.

Rozpoznanie anatomiczne

Oedema cerebri. Tumor medullae
spinalis in regione lumbo-sacralis.

Rozpoznanie histologiczne

Coma meningium

Encephalitis lymphocytaria, gliosa
et haemorrhagia vera, similiter post-
gripposa.

Zmiany zapalne dotyczą przede wszy-
stkim istoty białej półkul, następ-
nie pnia. Polegają one na rozlanym
zagęszczeniu gleju, na tle którego
występują przynaczyniowe nacieki lim-
focytarne oraz plakowate i obrętko-
wate zagęszczenia mikroglejowe.

./.

Oprócz tego w śródmózgowiu i w zwojach podstawy obserwuje się przy najbardziej zmienionych zapalnie naczyniach występowanie krwawych wybroczyn, tworzących krwotoczki koliste. Zmiany mają uderzającą akcentację na poziomie śródmózgowia. Wyraźnie słabną w opuszcze i rdzeniu. Kora zajęta jest lekko na pograniczu istoty białej, neuronofagii raczej się nie obserwuje.

W rdzeniu na poziomie lędźwiowym nie stwierdza się obecności guza: występuje tam prawdopodobnie anomalia rozwojowa: kanał położony na obwodzie rdzenia - od niego półkolistie, po obwodzie rozchodzą się neuronury ruchowe - materiał został jednak zniekształcony przy krajaniu i trudno jest oddzielić zniekształcenie artefakcyjne od pierwotnego.

/Doc. dr med. E.Osetowska/.