

Osobne odbicie z Komisji fizyogr. za rok 1872.



### Chrzaszczę z okolic Miechowa w Królestwie Polskiem i Krakowa.

Podał W. KULCZYŃSKI.

Pierwsza część spisu niniejszego obejmuje gatunki zebrane w sierpniu 1872 r. w Mianolicach, wsi położonej na północ od Krakowa, odległej o 2 mile od Miechowa a o 6 od granicy galicyjskiej. Zbadanie tej okolicy nie może być obojętnem dla przyrodników galicyjskich, południowe bowiem kończy się wzgórz zapelniających ją, przekraczają granicę i zajmują północną część bylego W. Księstwa Krakowskiego. Rozgałęzienia te oddzielone od Karpat Wisłą, różnią się od nich dosyć znacznie, a różnice te najłatwiej będzie można wytłumaczyć właściwościami ich trzonu, dotąd pod względem fauny prawie nietkniętego.

Staraniem mojem będzie uzupełniać ile możności szczupły spis obecny, którego niedokładność niech niewinni ta okoliczność, że chrzaszczę wymienione zbierano w sierpniu, zatem w czasie do tego może najmniej stosownym.

W drugiej części spisu mieszczą się gatunki zebrane w Krakowskiem, częścią nowe dla kraju, częścią znajduwane tylko w innych okolicach Galicyi.

- Cicindela Germanica* L. Po ścierniskach.  
*Notiophilus aquaticus* L. Pod zbutwiałą korą.  
 — *biguttatus* Fabr. Z poprzednim.  
*Elaphrus Ulrichii* Redt. Nad potokami.  
*Carabus intricatus* L. W zbutwiałych pniakach.  
 — *auronitens* Fabr. Tak samo.  
 — *Ulrichii* Germ. Po polach.  
 — *cancellatus* Fabr. Tak samo.  
 — *Linnei* Panz. W zbutwiałych pniakach.  
 — *violaceus* Linn. Pod kamieniami.  
*Clivina fossor* L. i  
 — *collaris* Herbst. Pod naniesionemi przez potok gałęziami i liśmi.  
*Dromius agilis* Fabr. Pod korą dębów.  
*Metabletus truncatellus* Linn. Pod korą wierzb, drzew owocowych i t. d.  
*Loricera pilicornis* Fabr. Nad potokami.  
*Brosicus cephalotes* Linn. Pod kamieniami.  
*Calathus cisteloides* Ill. Pod kamieniami.  
 — *fulvipes* Gyll. Z poprzednim.  
 — *melanocephalus* Linn. Z poprzednimi.  
*Anchomenus angusticollis* Fabr. Pod korą zbutwiałych pni.  
 — *albipes* Fabr. Nad potokiem.  
 — *sevpunctatus* Fabr. i  
 — *parumpunctatus* Fabr. Po ugorach.  
*Olisthopus rotundatus* Payk. Pod kamieniami.  
*Feronia cuprea* Linn. Na polach, drogach, pod kamieniami i t. d.  
 — *lepida* Fabr. Jak poprzednia.  
 — *nigra* Schall. Pod kamieniami.  
 — *vulgaris* Linn. Tak samo.  
 — *ovalis* Duft. i  
 — *parallela* Duft. W cienistych wąwozach leśnych pod kamieniami.  
*Amara plebeia* Gyll. Z następującemi pod kamieniami i t. d.  
 — *acuminata* Payk.  
 — *familiaris* Duft.  
 — *aulica* Panz.  
 — *fulva* de Geer. Nad potokiem.  
*Harpalus azureus* Fabr. Na polach.  
 — *ruficornis* Fabr. Pod kamieniami.  
 — *aeneus* Fabr. Jak poprzedni.  
*Trechus minutus* Fabr. U korzeni drzew.  
 — *secalis* Payk. Tak samo.  
*Tachys nanus* Gyll. Pod korą.  
*Bembidium quadrimaculatum* L. i  
 — *quadriguttatum* Fabr. W żwirze nad potokiem.  
 — *lunipros* Herbst. Tak samo.

- Bembidium nitidulum* Marsh. W wilgotnym lesie bukowym.  
 — *Andreae* Fabr. Jak trzy pierwsze.  
*Tachypus pallipes* Duft. Pod korą i u korzeni drzew.  
*Hydroporus geminus* Fabr. W źródłach.  
*Philhydrus marginellus* Fabr. Nad potokiem po ulewnym deszczu.  
*Laccobius minutus* L. Z poprzednim.  
*Helophorus nubilus* Fabr.  
 — *aeneipennis* Thoms.  
 — *aquaticus* L. Z dwoma poprzednimi pod gałęziami naniesionemi przez potok.  
*Cyclonotum orbiculare* Fabr. Tak samo.  
*Sphaeridium scarabaeoides* L. Tak samo.  
*Cercyon haemorrhoum* Gyll. W gnoju.  
 — *quisquilius* Linn. Z poprzednim.  
*Cryptopleurum atomarium* Fabr. W gnijącym grzybie.  
*Falagria sulcata* Payk. W gnijącym grzybie.  
 — *obscura* Curt. Z poprzednią.  
*Myrmedonia funesta* Grav.  
 — *laticollis* Maerkel. Z poprzednią pomiędzy mrówkami *Lasius fuliginosus*.  
 — *canaliculata* Fabr. Pod kamieniami.  
*Chilopora rubicunda* Er. Nad potokiem.  
*Homalota cuspidata* Er. Pod korą wiązu.  
*Pronomaea rostrata* Er. Tak samo.  
*Tachinus flavipes* Fabr. W gnijącym grzybie.  
 — *bipustulatus* Fabr. U korzeni wierzb.  
 — *marginellus* Fabr.  
*Tachyporus abdominalis* Er. Pod liśćmi.  
 — *obtusius* L. Tak samo.  
*Bolitobius atricapillus* Fabr. W grzybach.  
*Quedius fulgidus* Fabr. Z poprzednim.  
*Philonthus aeneus* Rossi.  
 — *lepidus* Grav.  
 — *bipustulatus* Panz.  
 — *sanguinolentus* Grav.  
 — *ventralis* Grav.  
 — *fulvipes* Fabr.  
 — *tenuis* Fabr. Wraz z poprzednimi naniesiony przez potok.  
*Xantholinus ochraceus* Gyll.  
 — *punctatus* Payk.  
 — *tricolor* Fabr. W zbutwiałym pniaku.  
*Othius fulvipennis* Fabr. Tak samo.  
*Lathrobium fulvipenne* Grav. Pod kamieniami.  
*Stilicis rufipes* Germ. Z następującymi u korzeni drzew.  
 — *orbiculatus* Payk.  
 — *affinis* Er.  
*Sunius filiformis* Latr. Jak następujący, w mchu.

- Sunius angustatus* Payk.  
*Paederus riparius* Linn. Nad wodami.  
 — *longipennis* Er. Tak samo.  
*Stenus biguttatus* Linn. Nad wodami.  
 — *providus* Er. Tak samo.  
 — *buphthalmus* Grav. Tak samo.  
 — *tarsalis* Ljung. Tak samo.  
*Bledius opacus* Block. i  
 — *rufipennis* Er. Naniesione przez potok.  
*Oxytelus piceus* Linn. i  
 — *rugosus* Fabr. W gnijącym grzybie.  
*Haploderus caelatus* Grav. W starój hubie.  
*Trogophloeus scrobiculatus* Er.  
 — *riparius* Beisd.  
*Megarthrus denticollis* Block. W starój hubie.  
 — *hemipterus* Ill. Tak samo.  
*Bythinus securiger* Reich. Pod kamieniami.  
*Silpha obscura* Linn.  
 — *atrata* Linn.  
*Necrophorus humator* Fabr. i  
 — *vespillo* Linn. W gnijącym grzybie.  
*Colenis dentipes* Gyll.  
*Liodes humeralis* Fabr. Na starych pniakach.  
 — *castaneus* Herbst. Tak samo.  
*Scaphidoma quadrimaculatum* Oliv. W grzybach.  
*Scaphisoma agaricinum* Oliv. W wielkiej ilości pod pleśniejącą korą na pniakach sosnowych.  
*Platysoma depressum* Fabr. W wielkiej ilości pod korą wiązu.  
*Hister unicolor* Linn. i  
 — *carbonarius* Ent. Heft. W gnijącym grzybie.  
*Dendrophilus punctatus* Herbst. W ziemi między *Lasius fuliginosus*.  
*Abraeus globosus* Ent. Heft. W zbutwiałym wiązie, w którym także *Lasius fuliginosus* miał gniazdo.  
*Phalacrus corruscus* Payk. Na korze pniaków.  
*Olibrus aeneus* Ill. Złapany saczkiem na ziołach.  
 — *Millefolii* Payk. Tak samo.  
*Brachypterus gravidus* Ill. W kwiatach: *Linaria vulgaris*.  
*Soronia grisea* Linn. U korzeni drzew.  
*Meligethes aeneus* Fabr. Na kwiatach.  
*Ips quadripustulatus* Fabr. Pod korą wiązu.  
*Rhizophagus bipustulatus* Fabr. Tak samo.  
*Ditoma crenata* Herbst. Tak samo.  
*Cerylon histeroideus* Fabr. i  
 — *deplanatum* Gyll. Tak samo.  
*Brontes planatus* Linn. W wielkiej ilości pod korą wiązu i dębów.

- Silvanus bidentatus* Fabr. Z następującym pod korą wiązu ale o wiele rzadszy.
- *unidentatus* Fabr.
- Lathridius rugosus* Herbst. Na grzybie.
- *transversus* Oliv. U korzeni drzew.
- Corticaria gibbosa* Herbst. Tak samo.
- Mycetophagus quadripustulatus* Linn. Z dwoma następującymi w grzybie; bardzo pospolicie.
- *multipunctatus* Hellw. Dosyć rzadki.
- *fulvicollis* Fabr. Bardzo rzadki.
- Lithargus bifasciatus* Fabr. Pod korą wiązu.
- Anthrenus muscorum* Linn. Na kwiatach roślin okólkowych.
- Syncalyptra setigera* Ill. Naniesiona przez potok.
- *spinosa* Rossi. Nad potokiem.
- Cytilus varius* Fabr. Na piaskach nad potokiem.
- Linnichus sericeus* Duft. Nad potokiem.
- Oonthophagus fracticornis* Preysl. W gnoju.
- Aphodius erraticus* Linn. W gnoju.
- *subterraneus* Linn. Tak samo.
- *fimetarius* Linn. Tak samo.
- *porcatus* Fabr. W bardzo wielkiej ilości w gnijącym grzybie
- Geotrypes stercorarius* Linn. W gnoju.
- *mutator* Marsh. i
- *sylvaticus* Parz. Tak samo.
- *vernalis* Linn. W gnijącym grzybie.
- Cetonia aurata* Linn. Na okólkowych.
- Osmoderma eremita* Linn. W wypróchniałym dębie.
- Buprestis Mariana* Linn. W lasach sosnowych (w pniakach nieżywe okazy, które się z nich po przepoczwarczeniu wydobyć nie mogły).
- Anthaxia quadripunctata* L. 1 okaz przypadkowo złapany w domu.
- Trachys minutus* Linn. Na młodych pędach osiki.
- Laeon murinus* Linn.
- Dictyoptera sanguinea* Linn. Na okólkowych.
- Rhagonycha fulva* Scop. Tak samo.
- Malachius aeneus* Linn.
- *marginellus* Oliv.
- Axinotarsus pulicarius* Fabr. Z dwoma poprzednimi złapany saszkiem.
- Clerus formicarius* Linn. Na pniakach sosnowych.
- Trichodes apiarius* Linn. Na okólkowych.
- Opetiopalpus scutellaris* Ill. W lesie sosnowym.
- Cis boleti* Scop. Na hubach wierzbowych.
- Crypticus quisquilius* Linn. Na suchych stokach.
- Opatrum sabulosum* Linn. Tak samo.
- Scaphidema aeneum* Payk.
- Tenebrio molitor* Linn. Pod korą dębów.

- Cistela atra* Fabr. Pod korą jabłoni.  
*Rhinosimus planirostris* Fabr. Pod korą wiązu.  
*Hallomenus humeralis* Panz. W starój hubie.  
*Lagria hirta* Linn. Na kwiatach.  
*Nothoxus monoceros* Linn.  
*Mordella fasciata* Fabr. Na kwiatach.  
*Chrysanthia viridis* Schmidt. Na kwiatach.  
*Otiorynchus ovatus* Linn.  
*Strophosomus Coryli* Fabr. Na leszczynie.  
— *obesus* Marsh. Tak samo.  
*Sciaphilus muricatus* Fabr. 2 okazy na świeżym grzybie.  
*Eusomus ovulum* Ill. Na piaskach.  
*Sitones flavescens* Marsh. Z następującymi gatunkami tego rodzaju  
łapany saszkiem na polach, pastwiskach i t. d.  
— *sulcifrons* Thunb.  
— *tibialis* Herbst.  
— *lineatus* Linn.  
— *hispidulus* Fabr.  
*Polydrosus Picus* Fabr. Na krzakach.  
*Hypera punctata* Fabr. Przy spróchniałych pniakach.  
— *suspiciosa* Herbst.  
— *variabilis* Herbst.  
— *Polygoni* Fabr. Złapane saszkiem.  
*Cleonus marmoratus* Fabr. Na suchym ugorze porośłym przewa-  
żnie bławatami.  
*Erirhinus acridulus* Linn. U korzeni wierzb.  
*Anoplus plantaris* Naezen. Na olszach.  
*Balaninus crux* Fabr. Na pniu wierzby.  
*Orchestes Fagi* Linn.  
— *Rusci* Herbst.  
— *Stigma* Germ. Złapane saszkiem.  
*Tychius tomentosus* Herbst. Z następującymi łapany saszkiem na  
miejscach piaszczystych.  
— *iunceus* Reichb.  
— *picrostris* Fabr.  
*Cionus Scrophulariae* Linn. Na *Scrophularia nodosa*.  
— *Solani* Fabr. Na *Verbascum*.  
*Coeliodes quadrimaculatus* Herbst. Na pokrzywach.  
— *Lamii* Herbst. Złapany saszkiem na łące.  
— *Geranii* Payk. Na kwiatach bodziszka (*Geranium pratense*).  
*Ceutorhynchus assimilis* Payk. Złapany saszkiem.  
— *quadridens* Panz. Na liściach kapusty.  
— *punctiger* Gyll. Złapany saszkiem.  
— *sulcicollis* Gyll. S. Na kapuście i t. d.  
— (*Ceutorhynchideus*) *trododytes* Fabr. Nad potokiem na  
piasku.  
— *floralis* Payk. Złapany saszkiem.

*Apion Pomonae* Fabr. Jak inne gatunki tego rodzaju, łapany saszkiem.

- *Craccae* Linn.
- *Onopordi* Kirby. Na ostach.
- *stolidum* Germ.
- *atomarium* Kirby.
- *difficile* Herbst.
- *radiolus* Kirby.
- *dispar* Germar.
- *pubescens* Kirby.
- *seniculus* Kirby.
- *Viciae* Payk.
- *dissimile* Germ.
- *Fagi* Linn.
- *assimile* Kirb.
- *Trifolii* Linn.
- *flavipes* Fabr.
- *nigritarse* Fabr.
- *ebeninum* Kirb.
- *tenuë* Kirb.
- *virens* Herbst.
- *Gyllenhalii* Kirb.
- *minimum* Herbst.
- *Sorbi* Herbst.
- *vorax* Herbst.
- *avidum* Germ.
- *violaceum* Kirb.
- *Marchicum* Herbst.
- *humile* Germ.

*Rhynchites nanus* Payk. Złapany saszkiem.

*Spermophagus Cardui* Gyll, S.

*Bruchus seminarius* Linn.

*Spondylis buprestoides* Linn. W starych pniakach.

*Prionus coriarius* Linn. W wypróchniałych grabach.

*Aromia moschata* Linn. Na wierzbach.

*Hylotrypes baiulus* Linn. Na drewnianych budynkach.

*Criocephalus rusticus* Linn. Złapany wieczorem w locie.

*Clytus sulphureus* Schaum. Na okólkowych.

*Pogonochoerus hispidus* Fabr. Koło domu.

*Strangalia quadrifasciata* Linn. Na młodéj osice.

— *bifasciata* Müll. i

— *melanura* Linn. Na ziołach.

*Leptura testacea* Linn. Na ziołach, pniakach i t. d.

*Lema cyanella* Linn. i

— *melanopa* Linn. Złapane saszkiem.

*Crioceris 12-punctata* Linn. i

— *Asparagi* Linn. Na szparagach.

- Clythra quadrimaculata* Linn. Na suchym stoku.  
*Pachnephorus tessellatus* Duft. i  
 — *arenarius* Fabr. Tak samo.  
*Cryptocephalus sericeus* Linn. Łapany saczkiem.  
 — *Moraei* Linn. Tak samo.  
 — *minutus* Fabr. Na suchym stoku.  
 — *labiatus* Linn. Łapany saczkiem.  
*Timarcha metallica* Fabr.  
*Chrysomela varians* Fabr. Na *Hypericum*.  
 — *Goettingensis* Linn. Pod kamieniami.  
 — *analis* Linn. Tak samo.  
 — *Menthastri* Suffr. Na mięcie.  
 — *cerealis* Linn. var. *Megertei* Fabr. Pod kamieniami.  
 — *polita* Linn. Na mięcie.  
 — *fucata* Fabr.  
*Lina Populi* Linn. Z następującą na wiklinie.  
 — *Tremulae* Fabr.  
*Gastrophysa Polygoni* Linn. Złapana saczkiem.  
*Phratora Vitellinae* Linn. Na wiklinie.  
*Adimonia Tanacetii* Linn.  
 — *Capreae* Linn. Złapane saczkiem.  
*Crepidodera ferruginea* Scop. Tak samo.  
 — *nitidula* Linn. Tak samo.  
*Graptodera oleracea* Linn. Tak samo.  
*Aphthona Cyparissiae* Ent. Heft. Na suchym stoku.  
*Phyllotreta nigripes* Panz. All.  
 — *nemorum* Linn.  
*Dibolia femoralis* Redt.  
 — *Cynoglossi* E. H. Z poprzedniemi łapane saczkiem.  
*Cassida sanguinolenta* Fabr.  
 — *rubiginosa* Ill. Na ostach.  
 — *margaritacea* Schall. Na suchym stoku.  
 — *nebulosa* Linn.  
 — *obsoleta* Ill.  
 — *equestris* Fabr. Na ostach.  
*Engis humeralis* Fabr. W wielkiej ilości w starój hubie.  
*Tritoma bipustulata* Fabr. Tamże.  
*Endomychus coccineus* Linn. Na pniaku sosnowym.  
*Hippodamia 13-punctata* Linn.  
*Coccinella mutabilis* Scriba.  
 — *bipunctata* Linn.  
 — *impustulata* Linn.  
 — *quatuordecimpustulata* Linn.  
 — *variabilis* Ill.  
 — *quinquepunctata* Linn.  
 — *septempunctata* Linn.  
*Halyzia quatuordecimguttata* Linn.

*Halyzia vigintiduopunctata* Linn. i *14-punctata* Linn.  
*Micraspis duodecimpunctata* Linn.  
*Exochomus quadripustulatus* Linn.  
*Epilachna globosa* Schneid.  
*Coccidula rufa* Herbst. Wraz z poprzednimi złapana saszkiem.

---

*Carabus nitens* L. Olszanica.  
 — *convexus* Fabr. Skąły Pan. 3, pod mchem u korzeni drzew.  
 — *hortensis* Linn. Skąły Pan. 3, tak samo.  
 — *Linnei* Panz. Skąły Pan. 3, tak samo.  
 — *glabratus* Payk. Skąły Pan. 6, Tenczynek 6, pod kamieniami.  
*Brachinus crepitans* Linn. Krzemionki 4, pod kamieniami.  
*Dromius linearis* Oliv. Zwierzyniec 6, pod korą starego kołka.  
 — *nigriventris* Thoms. Bielany 11, w mchu.  
*Chlaenius nigricornis* Fabr. var. *melanocornis* Dej. Mogilany 4, pod kamieniami.  
*Amara tricuspidata* Dej. Bielany 11, w mchu.  
*Badister bipustulatus* Fabr. Olsza 12, Krzemionki 3, pod kamieniami.  
*Diachromus germanus* Linn. Krzemionki.  
*Harpalus distinguendus* Duft. Olsza 4, na drodze.  
*Bembidium fluviatile* Dej. Olsza 4, brzegi Wisły 6, 7.  
*Hydaticus Austriacus* Sturm. Błonia krakowskie.  
*Ischnoglossa corticina* Er. Tenczynek 6, pod korą pniaka sosnowego.  
*Aleochara rufipennis* Er. Skąły Pan. 5, na kościach.  
*Myrmedonia humeralis* Grav. Mogilany 4, między *Formica rufa*.  
*Staphylinus fossor* Scop. Krzemionki 4, pod kamieniem.  
*Emus hirtus* Scop. Morawica, Olsza, w gnoju.  
*Bolitobius formosus* Grav. Pod korą sosen, Las Krzyszkowicki 3, Skąły Pan. 11.  
*Lathrobium pallidum* Skąły Pan. 6, pod kamieniami.  
*Coprophilus striatulus* Fabr. Błonia krakowskie 5.  
*Omalium fossulatum* Er. Las Krzyszkowicki 3, w mchu.  
 — *deplanatum* Gyll. Na świeżo ściętych pniakach olszowych, Skąły Pan. 5, Kępa 6.  
*Phloeocharis subtilissima* Mannh. U korzeni sosen. Skąły Pan. 3 Wola Duchacka 4.  
*Trichonyx sulcicollis* Reichb. Skąły pan., pod kamieniami.  
*Bryaxis sanguinea* Linn. Las Krzyszkowicki 3, w mchu.  
*Euplectus signatus* Reichb. Z poprzedzającym.  
 — *Karstenii* Reichb. Skąły Pan. 4, w mchu.  
 — *ambiguus* Reichb. Skąły Pan. 12, w mchu.  
*Scydmaenus pubicollis* M. et Kz. Z poprzedzającym.  
*Catops picipes* Fabr. Skąły Pan. 5, na kościach.  
 — *sericeus* Panz. Tak samo.

- Necrophorus mortuorum* Fabr. Tak samo.  
*Agyrtes glaber* Payk. Skały Pan. 12, w mchu.  
*Agaricophagus cephalotes* Schmidt. Skały Pan.  
*Amphicyllis globus* Fabr. Las Krzyszkowicki 3, w mchu.  
*Agathidium atrum* Payk. Las Krzyszkowicki 12, w mchu.  
*Hololepta plana* Füssly. Kraków 5, pod korą topoli włoskiej,  
 Skały Pan. 5.  
*Myrmex piceus* Payk. Mogilany 4, między mrówkami *Formica*  
*rufa*, Tenczynek 6, na pniaku świerkowym.  
*Paromalus parallelopedus* Herbst. Tenczynek 6, pod korą pniaka  
 świerkowego.  
*Teretrius picipes* Fabr. Rybaki 6, na płocie.  
*Cercus pedicularius* L. Swoszowice 6, Las Krzyszkowicki 7, na  
 kwiatach.  
*Omosita discoidea* Fabr. Skały Pan. 5, na kościach.  
*Pityophagus ferrugineus* L. Kraków 5, pod korą.  
*Cerylon deplanatum* Gyll. Skały Pan. 5, pod korą pniaka bukowego.  
*Lathridium angusticollis* Humm. Kępa 10, w mchu.  
*Trogoderma versicolor* Creutz. Kraków 5, Wola Justowska 7, na  
 budynkach.  
*Aphodius sus* Fabr. Błonia krakowskie.  
*Ammoecius brevis* Er. Krzemionki 4, pod kamieniem.  
*Rhyssenus germanus* Linn. Olsza 4, Bielany 7, na piaskach.  
*Psammodytes sulcicollis* Ill. Czarna wieś 6, w locie złapany.  
*Trox sabulosus* Linn. Skały Pan. 5, na kościach.  
*Ochodaeus chrysomelinus* Fabr. Bielany 5, na piaszczystym polu  
*Serica holosericea* Scop. Krzemionki 5, 6, pod kamieniami.  
*Anisoplia fruticola* Fabr. Tenczynek 6, na życie.  
*Agrilus angustulus* Ill. Skały Pan. 7, na młodych dębach.  
*Trachys troglodytes* Gyll. Skały Pan. 6, na oście.  
*Cryptohypnus pulchellus* L. Tenczynek 6, Łobzów 7, na piaskach.  
*Cardiophorus vestigialis* Er. Olsza 4.  
*Helodes minuta* Linn. Czarna 6, na liściach olszy.  
*Lamprorhiza splendidula* Linn. Skały Pan. 7, między ziołami na  
 ziemi.  
*Malthinus fasciatus* Fall. Skały Pan. 6, 7, Las Krzyszkowicki 7,  
 na młodych dębach.  
 — *punctatus* Fourcr. Tamże.  
*Ebaeus flavicornis* Er. Biała 7.  
*Tillus elongatus* Linn. Podgórze 7, na murze.  
*Opilus domesticus* Sturm. Kraków, po domach 5, 6, 7.  
*Corynetes ruficornis* Sturm. Kraków.  
*Anobium rufipes* Fabr. Rybaki 6, na wierzbie, Kraków 6.  
*Tripopitys Carpini* Herbst. Skały Pan.  
*Microzomum tibiale* Fabr. Krzemionki 4, na piaskach.  
*Allecula morio* F. Bielany 7, na korze wypróchniałych dębów.

- Cistela murina* L. i *var. thoracica* Fabr. Skąły Pan. 6, na *Cornus sanguinea*.
- Rhinosimus ruficollis* Linn. Bielany 11, pod korą dębów.
- Tetratoma ancora* Fabr. Skąły Pan. 12, w mchu.
- Hypulus bifasciatus* Fabr. Skąły Pan.
- Scraptia fuscata* Müll. Skąły pan. 7, W wypróchniałym dębie.
- Otiorhynchus niger* Fabr. *var. villosopunctatus* Gyll. Tenczynek 6.  
— *septentrionis* Herbst. Tamże.
- Tropiphorus Mercarialis* F. Skąły Pan. 12, w mchu.
- Metallites mollis* Germ. Czarna 6, na młodych świerkach.  
— *atomarius* Oliv. Tamże.
- Molytes carinaerostris* Gyll. S. Sikornik 6.
- Liosomus cribrum* Gyll. S. Skąły Pan. 9.
- Hypera tessellata* Herbst. Błonia krakowskie 5, w świeżo wykopanych dolach.
- Adexius scrobipennis* Gyll. S. Las Krzyszkowicki 3, w mchu.
- Trachodes hispidus* Linn. Tak samo.
- Cleonus turbatus* Fabr. Krzemionki 4, na piaskach.
- Lixus Ascanii* Linn. Rybaki.
- Pissodes Haryanae* Herbst. Kraków 7, na murze.
- Mecinus collaris* Germ. Olsza w pierwszej połowie kwietnia na młodych liściach babki *Plantago maior*.
- Bagous frit* Herbst. Olsza 4, na ziołach nad wodą.  
— *lutulentus* Gyll. Tak samo.
- Anthonomus druparum* Linn. Las Krzyszkowicki 12, w mchu.
- Acalyptus Carpini* Herbst. Bielany 11, w mchu.
- Orchestes Ilicis* Fabr. Skąły Pan. 11, w mchu.
- Coryssomerus capucinus* Beck. Olsza 4, między ziołami.
- Nanophyes globulus* Germ. Kępa 7, na *Lythrum Salicaria*.
- Ceutorhynchus litura* Fabr. Sikornik 7, Wielki las, złapany saszkiem.  
— *trimaculatus* Fabr. Olsza 4, na młodych ostach, Wola Justowska 7, złapany saszkiem.  
— *asperifoliarum* Gyll. Las Krzyszkowicki 12, w mchu.  
— *aenicollis* Germ. Kraków 5, między listkami krwawnika *Achillea millefolium*.
- Gymnetron pilosus* Gyll. S. W kwiatach *Linaria vulgaris* na brzegach Wisły 7.
- Baridius chloris* Panz. Olsza 4.  
— *Lepidii* Germ. Biały Prądnik 7.
- Cossonus ferrugineus* Clairv. Kraków 5, pod korą topoli.  
— *cylindricus* Sahlb. Tak samo.
- Magdalinus aterrimus* Fabr. Czarna wieś 7, na płocie.
- Apion striatum* Kirby. Skąły Pan.
- Hylastes cunicularius* Er. Tenczynek 6.
- Hylurgus minor* Hartig. Las Krzyszkowicki 3, w locie.
- Dendroctonus micans* Kug. Tenczynek 6, w lesie świerkowym.

(12)

- Crypturgus cinereus* Herbst. Tak samo.  
*Bostrychus curvidens* Germ. Tak samo.  
*Rhynchites Bacchus* Linn. Skały Pan. 9.  
*Rhynchites cupreus* Linn. Las Krzyszkowicki 7, złapany saszkiem.  
*Tropideres dorsalis* Thunb. Kraków 6, na murze.  
*Tetropium luridum* Linn. i var. *fulcratum* Fabr. Tenczynek 6,  
na pniaku świerkowym.  
— *fuscum* Fabr. Tamże.  
*Obrium brunneum* Fabr. Czerna 6.  
*Pogonochoerus hispidus* Fabr. Skały Pan. 12, w mchu.  
— *dentatus* Fourer. Krakow 8, na murze.  
*Strangalia revestita* Linn. Skały Pan.  
*Cryptocephalus gracilis* Fabr. Skały Pan., Las Krzyszkowicki 7.  
— *bipustulatus* Linn. var. *lineola* Fabr. Sikornik 7.  
*Entomoscelis Adonidis* Fabr. Kraków.  
*Prasocuris Hannoverana* Fabr. Rybaki, Mogilany 4, na *Caltha palustris*.  
*Halyzia tigrina* Linn. var. *vigintiguttata* Linn. Las Krzyszkowicki 12, Skały Pan. 12, 3, w mchu.

