

4. *Bombus laesus* Moraw.³⁾ ♀. — Femelle. Conforme aux exemplaires typiques de Turkestan, dans lesquels le dos du thorax est d'une couleur rousse tirant au rouge et le reste du corps est jaune très pâle uni, tandis que les exemplaires européens ont le dos du thorax roux et les premiers segments abdominaux sont d'un roux plus foncé que les autres.

5. *Bombus Mlokosewiczii* Rad. (Bull. Moscou, 1877, p. 212). ♀. — Une femelle.

6. *Bombus canus* Pall. (in Museo Berolinensi). ♂ ♀. — Ouvrière et mâle.

7. *Bombus hortorum*. ♀. — Une ouvrière de la variété ayant le 1^{er} segment abdominal noir.

8. *Bombus Portschinskyi* Rad. ♂. — Mas. *Supra fulvus, fascia inter alas segmentisque abdominalibus 3^o, 6^o et 7^o nigris.*

Mâle. Il se distingue visiblement du mâle de *B. hortorum* par sa taille, qui est plus forte, et par les poils plus longs, plus soyeux et moins serrés. — Noir. Le bord du chaperon faiblement sinué. Sur le vertex on voit des poils jaunes pâles. Une large bande prothoracique formée de poils jaunes pâles descend sur la poitrine et l'écusson. Les deux premiers segment abdominaux, ainsi que les 4^{me}—5^{me}, sont couverts de poils jaunes, les segments restant garnis de poils noirs. Le ventre cilié de poils d'un jaunâtre sale. Ailes faiblement enfumées. — Lg. 19½ mm.

L'armure copulatrice comme celle de *B. hortorum*.

Par la stature cette espèce se rapproche tellement du *Psithyrus* qu'avant l'examen de l'armure je l'ai nommé *Psithyrus Mlokosewiczii* (Séance des naturalistes de l'université de Varsovie, 8/XII 1889). En 1883 (Bull. Moscou, p. 211) j'ai donné la description de la femelle de cette espèce qui diffère du véri-

de ces deux espèces diffèrent aussi par leur plastique: dans le *B. Stewenii* la face et le vertex sont garnis de poils jaunes et la barbe est roussâtre, tandis que chez *B. calidus* ces parties sont noires.

³⁾ Voyage Fedtchenko en Turk., Apidae, p. 3.

