

4. Grupa *Pleuroxinae* Nob.

I. Szpony mają u podstawy jeden kolec tylko.

1. Szpony krótkie, kolec podstawowy szpony długi — kolec na tylnym brzegu skorupki dosyć długi, ostry. Dzióbek nie wydłużony. Odwłok krótki z obfitem bocznym uzbrojeniem.

12. *Landea* Nob. nov. gen.

(*Landea Syrenopolitana* Nob.¹⁾)

2. Szpony długie, kolec podstawowy szpony krótki, ząbek na tylnym brzegu skorupki mały albo go brak. Dzióbek wydłużony. Odwłok długi, bocznego uzbrojenia brak.

13. *Lynceus* Müller

(*Alona rostrata* Koch.).

II. Szpony mają u podstawy dwa kolce; pierwszy, licząc od podstawy szpony mały, drugi większy.

1. Cały brzeg tylny skorupki kolecami obsadzony.

14. *Peracantha* Baird.

(*Pleuroxus truncatus* Müller).

2. Tylko dolna część tylnego brzegu kolecami obsadzona, niekiedy brak koleców.

A. Dzióbek krótki, mniej lub więcej prosty, albo słabo wygięty.

15. *Alonella* Sars.

(*Pleuroxus excisus* Fischer etc.).

B. Dzióbek długi.

a) Dzióbek spuszcisty, równomiernie zgięty.

16. *Pleuroxus* Baird.

(*Pleuroxus hastatus* Sars. etc.).

b) Koniec dzióbka do góry zadarty i naprzód zwrócony.

17. *Rhypphilus* Schödler.

(*Pleuroxus personatus* Schödl.).

¹⁾ Rodzaj ten nazywamy na cześć dr. Adama Landego, którego uprzejmości zawdzięczamy ten jak i wiele innych gatunków wioślarek z okolic Warszawy.

