

- Sunius angustatus* Payk.
Paederus riparius Linn. Nad wodami.
 — *longipennis* Er. Tak samo.
Stenus biguttatus Linn. Nad wodami.
 — *providus* Er. Tak samo.
 — *buphthalmus* Grav. Tak samo.
 — *tarsalis* Ljung. Tak samo.
Bledius opacus Block. i
 — *rufipennis* Er. Naniesione przez potok.
Oxytelus piceus Linn. i
 — *rugosus* Fabr. W gnijącym grzybie.
Haploderus caelatus Grav. W starój hubie.
Trogophloeus scrobiculatus Er.
 — *riparius* Beisd.
Megarthrus denticollis Block. W starój hubie.
 — *hemipterus* Ill. Tak samo.
Bythinus securiger Reich. Pod kamieniami.
Silpha obscura Linn.
 — *atrata* Linn.
Necrophorus humator Fabr. i
 — *vespillo* Linn. W gnijącym grzybie.
Colenis dentipes Gyll.
Liodes humeralis Fabr. Na starych pniakach.
 — *castaneus* Herbst. Tak samo.
Scaphidoma quadrimaculatum Oliv. W grzybach.
Scaphisoma agaricinum Oliv. W wielkiej ilości pod pleśniejącą korą na pniakach sosnowych.
Platysoma depressum Fabr. W wielkiej ilości pod korą wiązu.
Hister unicolor Linn. i
 — *carbonarius* Ent. Heft. W gnijącym grzybie.
Dendrophilus punctatus Herbst. W ziemi między *Lasius fuliginosus*.
Abraeus globosus Ent. Heft. W zbutwiałym wiązie, w którym także *Lasius fuliginosus* miał gniazdo.
Phalacrus corruscus Payk. Na korze pniaków.
Olibrus aeneus Ill. Złapany saczkiem na ziołach.
 — *Millefolii* Payk. Tak samo.
Brachypterus gravidus Ill. W kwiatach: *Linaria vulgaris*.
Soronia grisea Linn. U korzeni drzew.
Meligethes aeneus Fabr. Na kwiatach.
Ips quadripustulatus Fabr. Pod korą wiązu.
Rhizophagus bipustulatus Fabr. Tak samo.
Ditoma crenata Herbst. Tak samo.
Cerylon histeroideus Fabr. i
 — *deplanatum* Gyll. Tak samo.
Brontes planatus Linn. W wielkiej ilości pod korą wiązu i dębów.

